

§3. Дроби и ряды

В этом параграфе мы продолжаем обозначать через K произвольное коммутативное кольцо с единицей, а через $\mathbb{k}$ — произвольное поле.

3.1. Кольца частных. Способ изготовления поля $\mathbb{Q}$ из кольца $\mathbb{Z}$ как множества дробей с целым числителем и ненулевым целым знаменателем¹ применим в любом коммутативном кольце K с единицей. Подмножество $S \subset K$ называется *мультипликативным*, если $1 \in S$ и $st \in S$ для всех $s, t \in S$. Например, множество всех целых неотрицательных степеней q^k любого элемента $q \in K$ мультипликативно². Множество $K^\circ \subset K$, состоящее из всех не делящих нуль ненулевых элементов, тоже мультипликативно. В частности, множество всех ненулевых элементов любого целостного кольца мультипликативно. Каждое мультипликативное подмножество $S \subset K$ задаёт на множестве упорядоченных пар $K \times S$ отношение эквивалентности $\sim_S$, порождённое³ отождествлениями $(a, s) \sim_S (at, st)$ для всех $t \in S$. Класс эквивалентности пары (a, s) по модулю этого отношения называется *дробью* со знаменателем в S и обозначается a/s . Множество всех таких дробей обозначается KS^{-1} или $K[S^{-1}]$ и называется *кольцом частных* или *локализацией* кольца K со знаменателями в S .

Пример 3.1

Пусть $K = \mathbb{Z}/(6)$ и $S = \{[1], [2], [-2]\}$. Каждая дробь в KS^{-1} имеет представление со знаменателем $[1]$: $[a]/[\pm 2] = [a][\mp 2]/[\pm 2][\mp 2] = [\mp a][2]/[1][2] = [\mp a]/[1]$. В частности, $[0]/[\pm 2] = [0]/[1]$. Далее, $[\pm 2]/[1] = [\pm 2][2]/[1][2] = [\mp 1][2]/[1][2] = [\mp 1]/[1]$. Наконец, $[3]/[1] = [3][2]/[1][2] = [0]/[2] = [0]/[1]$. Тем самым, KS^{-1} исчерпывается дробями $[0]/[1]$, $[1]/[1]$ и $[-1]/[1]$.

Упражнение 3.1. Убедитесь, что эти три дроби различны.

Обратите внимание, что

$$\frac{[2]}{[1]} = \frac{[-1]}{[1]}, \text{ но } [2] \cdot [1] \neq [-1] \cdot [1], \text{ и } \frac{[3]}{[1]} = \frac{[0]}{[1]}, \text{ но } [3] \cdot [1] \neq [0] \cdot [1].$$

Лемма 3.1

$a/s = b/t$ в KS^{-1} если и только если $atu = bsu$ в K для некоторого $u \in S$.

Доказательство. Положим $(a, s) \approx (b, t)$, если $atu = bsu$ для некоторого $u \in S$. Двухшаговая цепочка отождествлений $(a, s) \sim_S (atu, stu) = (bsu, tsu) \sim_S (b, t)$ показывает, что отношение $\approx$ содержится в отношении $\sim_S$. Остаётся проверить, что отношение $\approx$ является отношением эквивалентности — тогда оно совпадёт с $\sim_S$ в силу минимальности последнего. Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность. Пусть $(a, s) \approx (b, t)$ и $(b, t) \approx (c, r)$, т. е. существуют такие $u, w \in S$, что $atu = bsu$ и $brw = ctw$. Тогда

$$ar(tuw) = (atu)rw = (bsu)rw = (brw)su = (ctw)su = cs(tuw),$$

т. е. $(a, s) \approx (c, r)$. □

¹См. прим. 0.5 на стр. 11 и прим. 1.2 на стр. 21.

²Мы по определению полагаем $q^0 = 1$.

³Т. е. наименьшее по включению отношение эквивалентности $R \subset (K \times S) \times (K \times S)$, содержащее все пары вида $((a, s), (at, st))$, где $t \in S$, см. н° 0.4.1 на стр. 11.

ЛЕММА 3.2

Операции $\frac{a}{r} + \frac{b}{s} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{as+br}{rs}$ и $\frac{a}{r} \cdot \frac{b}{s} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{ab}{rs}$ корректно задают на KS^{-1} структуру коммутативного кольца с единицей $1/1$ и нулём $0/1$.

Доказательство. Так как каждое отождествление $\sim_S$ является цепочкой элементарных отождествлений $(a, r) \sim_S (au, ru)$, где $u \in S$, достаточно проверить, что результаты операций не меняются при замене $\frac{a}{r}$ на $\frac{au}{ru}$, а $\frac{b}{s}$ — на $\frac{bw}{sw}$, где $u, w \in S$, что очевидно:

$$\begin{aligned} \frac{au}{ru} + \frac{bw}{sw} &= \frac{ausw + bwr u}{rusw} = \frac{(as + br) \cdot wu}{rs \cdot wu} = \frac{as + br}{rs} \\ \frac{au}{ru} \cdot \frac{bw}{sw} &= \frac{aubw}{rusw} = \frac{(ab) \cdot wu}{rs \cdot wu} = \frac{ab}{rs}. \end{aligned}$$

Проверку выполнения в KS^{-1} всех аксиом коммутативного кольца с единицей мы оставляем читателю в качестве упражнения. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 3.1

Кольцо KS^{-1} нулевое если и только если S содержит нуль.

Доказательство. Если $0 \in S$, то любая дробь $a/s = (a \cdot 0)/(s \cdot 0) = 0/0 = (0 \cdot 0)/(1 \cdot 0) = 0/1$ эквивалентна нулю. С другой стороны, $1/1 = 0/1$ только если существует такой $s \in S$, что $1 \cdot 1 \cdot s = 0 \cdot 1 \cdot s = 0$, откуда $s = 0 \in S$. $\square$

ТЕОРЕМА 3.1

Отображение $\iota_S : K \rightarrow KS^{-1}$, переводящее $a \in K$ в дробь $a/1 \in KS^{-1}$, является гомоморфизмом колец с ядром $\ker \iota_S = \{a \in K \mid \exists s \in S : as = 0\}$. Образ $\iota_S(s)$ любого элемента $s \in S$ обратим в KS^{-1} . Для любого гомоморфизма $\varphi : K \rightarrow R$ в целостное кольцо R , переводящего каждый элемент из S в обратимый элемент из R , существует единственный такой гомоморфизм колец $\varphi_S : KS^{-1} \rightarrow R$, что $\varphi = \varphi_S \circ \iota_S$.

Доказательство. Очевидно, что ι_S является гомоморфизмом. Дробь $\iota_S(a) = a/1$ равна $0/1$ если и только если найдётся такой $s \in S$, что $a \cdot 1 \cdot s = 0 \cdot 1 \cdot s = 0$. Обратным к $\iota_S(s) = s/1$ элементом является дробь $1/s$. Остаётся доказать последнее утверждение. Для продолжения гомоморфизма $\varphi : K \rightarrow R$ до гомоморфизма $\varphi_S : KS^{-1} \rightarrow R$ нет иного выбора как положить $\varphi_S(1/s) = 1/\varphi(s)$, так как в кольце R должны выполняться равенства $\varphi_S(1/s) \cdot \varphi_S(s) = \varphi_S(s \cdot (1/s)) = \varphi(1) = 1$. Следовательно, искомое продолжение обязано задаваться формулой $\varphi_S(a/s) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(a)/\varphi(s)$. Она корректна, поскольку при замене $\frac{a}{s}$ на $\frac{au}{su}$ с $u \in S$ имеем $\varphi_S\left(\frac{au}{su}\right) = \frac{\varphi(au)}{\varphi(su)} = \frac{\varphi(a)\varphi(u)}{\varphi(s)\varphi(u)} = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}$. Бесхитростную проверку того, что построенное отображение φ_S перестановочно со сложением и умножением, мы оставляем читателю. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 3.2. Пусть $K = \mathbb{Z}/(30)$, а $S = \{[2^k]_{30} \mid k = 0, \dots, 4\}$. Покажите, что $KS^{-1} \simeq \mathbb{Z}/(15)$.

ПРИМЕР 3.2 (поле частных целостного кольца)

Если кольцо K не имеет делителей нуля, его ненулевые элементы образуют мультипликативную систему. Кольцо частных со знаменателями в этой системе является полем. Оно называется *полем частных* целостного кольца K и обозначается Q_K . Равенство $a/b = c/d$ в Q_K равносильно равенству $ad = bc$ в K , а гомоморфизм $\iota : K \hookrightarrow Q_K, a \mapsto a/1$, инъективен, и любой гомоморфизм $\varphi : K \rightarrow R$ в целостное кольцо R , переводящий все ненулевые элементы из K в обратимые элементы кольца R , единственным способом продолжается до вложения поля частных $\tilde{\varphi} : Q_K \hookrightarrow R$.

Пример 3.3 (поле $\mathbb{Q}$)

Поле частных целостного кольца $\mathbb{Z}$ является поле рациональных чисел $\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$, которое канонически вкладывается в любое поле характеристики нуль в качестве простого подполя¹.

Пример 3.4 (поле рядов Лорана)

Поле частных кольца формальных степенных рядов $\mathbb{k}[[x]]$ с коэффициентами в произвольном поле $\mathbb{k}$ обозначается $\mathbb{k}((x)) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Q}_{\mathbb{k}[[x]]}$. Так как любой ряд с ненулевым свободным членом обратим² в $\mathbb{k}[[x]]$, каждая дробь $p(x)/q(x) \in \mathbb{k}((x))$ однозначно представляется в виде $x^m h(x)$, где $h \in \mathbb{k}[[x]]$ имеет ненулевой свободный член, а показатель $m \in \mathbb{Z}$ равен разности показателей младших членов рядов p и q . Иначе говоря, поле $\mathbb{k}((x))$ состоит из формальных степенных рядов вида $f(x) = \sum_{k \geq m(f)} a_k x^k$, в которых допускается конечное число мономов отрицательной степени. Такие ряды называются *рядами Лорана*, а поле $\mathbb{k}((x))$ — *полем рядов Лорана*. Номер $m(f) \in \mathbb{Z}$ самого левого ненулевого коэффициента ряда Лорана f называется *порядком* ряда f .

3.2. Рациональные функции. Поле частных кольца $\mathbb{k}[x]$ обозначается через $\mathbb{k}(x)$ и называется *полем рациональных функций* от x . Его элементами являются дроби вида $p(x)/q(x)$ с $p, q \in \mathbb{k}[x]$.

Предложение 3.1

Если $g = g_1 \dots g_m$, где $g_i \in \mathbb{k}[x]$ и $\text{нод}(g_i, g_j) = 1$ при $i \neq j$, то при любом $f \in \mathbb{k}[x]$ дробь f/g единственным образом представляется в виде суммы

$$\frac{f}{g} = h + \frac{f_1}{g_1} + \dots + \frac{f_m}{g_m}, \quad (3-1)$$

где $h \in \mathbb{k}[x]$ и $\deg f_i < \deg g_i$ при всех i .

Доказательство. Деля f на g с остатком³, заключаем, что $f/g = h + r/g$, где h — неполное частное, а остаток r имеет степень $\deg r < \deg g$. Если $g = g_1 g_2$ и $\text{нод}(g_1, g_2) = 1$, то $[g_2]_{g_1}$ обратим в $\mathbb{k}[x]/(g_1)$. Представим $[r]_{g_1}/[g_2]_{g_1} = [f_1]_{g_1}$ многочленом f_1 степени $\deg f_1 < \deg g_1$. Тогда $r = f_1 \cdot g_2 + f_2 \cdot g_1$ для некоторого $f_2 \in \mathbb{k}[x]$. Сравнивая степени, заключаем, что $\deg f_2 < \deg g_2$. Таким образом, $r/g = f_1/g_1 + f_2/g_2$ и к каждой из этих дробей применимо то же рассуждение, если её знаменатель является произведением взаимно простых многочленов. Это доказывает существование разложения (3-1). Для доказательства его единственности, умножим обе части разложения (3-1) на g . Получим равенство вида $f = hg + f_1 G_1 + \dots + f_m G_m$, где через $G_i = g/g_i$ обозначено произведение всех многочленов g_j кроме i -го. Так как $\deg(f_1 G_1 + \dots + f_m G_m) < \deg g$, многочлен h является неполным частным, а $r = f_1 G_1 + \dots + f_m G_m$ — остатком от деления f на g . Каждый f_i является тем единственным многочленом степени $< \deg g_i$, класс которого в $\mathbb{k}[x]/(g_i)$ равен $[f]_{g_i}/[G_i]_{g_i}$. Таким образом, все ингредиенты формулы (3-1) однозначно определяются многочленами f и $g_1, \dots, g_n$. $\square$

Предложение 3.2

Любую дробь вида f/g^m , в которой $\deg f < \deg g^m = m \deg g$, можно единственным образом представить в виде суммы

$$\frac{f}{g^m} = \frac{f_1}{g} + \frac{f_2}{g^2} + \dots + \frac{f_m}{g^m}, \quad (3-2)$$

где $\deg f_i < \deg g$ при всех i .

¹См. н° 1.5.6 на стр. 32.

²См. прим. 2.2 на стр. 37.

³См. н° 2.2 на стр. 39.

Доказательство. Представление (3-2) равносильно записи f в виде

$$f = f_1 g^{m-1} + f_2 g^{m-2} + \dots + f_{m-1} g + f_m, \quad (3-3)$$

аналогичном записи целого числа f в g -ичной позиционной системе исчисления: f_m является остатком от деления f на g , f_{m-1} — остатком от деления частного $(f - f_m)/g$ на g , f_{m-2} — остатком от деления частного $\left(\frac{f-f_m}{g} - f_{m-1}\right)/g$ на g и т. д. $\square$

3.2.1. Разложение на простейшие дроби. Из предыдущих двух предложений вытекает, что каждая дробь $f/g \in \mathbb{K}(x)$ допускает *единственное* представление в виде суммы неполного частного от деления f на g и дробей вида p/q^m , где q пробегает неприводимые делители знаменателя g , показатель m меняется от 1 до кратности вхождения q в разложение g на неприводимые множители, и в каждой из таких дробей $\deg p < \deg q$. Такое представление называется *разложением f/g на простейшие дроби* и бывает полезно в практических вычислениях с рациональными функциями.

ПРИМЕР 3.5

Вычислим 2022-ю производную, а также первообразную¹ от $1/(1+x^2)$. Разложим эту дробь в поле $\mathbb{C}(x)$ на простейшие:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{\alpha}{1+ix} + \frac{\beta}{1-ix}, \quad \text{где } \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

Подставляя $x = \pm i$ в равенство $1 = \alpha(1-ix) + \beta(1+ix)$, находим $\alpha = \beta = 1/2$, т. е.

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} \right).$$

Теперь дифференцируем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dx} \right)^{2022} \frac{1}{1+x^2} &= \frac{2022!}{2} \left(\frac{(-i)^{2022}}{(1+ix)^{2023}} + \frac{i^{2022}}{(1-ix)^{2023}} \right) = \\ &= -2022! \cdot \frac{1}{2} \frac{(1-ix)^{2023} + (1+ix)^{2023}}{(1+x^2)^{2023}} = 2022! \cdot \sum_{v=0}^{1011} \binom{2023}{2v} \cdot \frac{(-1)^{v+1} x^{2v}}{(1+x^2)^{2023}}, \end{aligned}$$

и интегрируем каждое слагаемое:

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+ix} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1-ix} = \frac{\ln(1+ix) - \ln(1-ix)}{2i} = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+ix}{1-ix} = \operatorname{arctg} x.$$

Подчеркнём, что все проделанные вычисления корректно определены в кольце $\mathbb{C}[[x]]$, а все написанные равенства суть равенства между элементами этого кольца².

¹Т. е. такой ряд f без свободного члена, что $f'(x) = 1/(1+x^2)$. Подробнее см. в н° 3.3 на стр. 59.

²В частности, последнее равенство вытекает из определения тангенса:

$$\operatorname{tg} t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{1}{i} \cdot \frac{e^{it} - e^{-it}}{e^{it} + e^{-it}} = \frac{1}{i} \cdot \frac{e^{2it} - 1}{e^{2it} + 1} \in \mathbb{C}[[t]].$$

Полагая $\operatorname{tg} t = x$, получаем $e^{2it} = \frac{1+ix}{1-ix}$. Про экспоненту и логарифм мы ещё подробно поговорим в н° 3.3 на стр. 59 ниже.

3.2.2. Разложение рациональной функции в степенной ряд. По теор. 3.1 на стр. 54 существует единственное вложение $\mathbb{k}(x) \hookrightarrow \mathbb{k}((x))$, переводящее каждый многочлен в себя. Иначе говоря, каждую рациональную функцию можно разложить в ряд Лорана. Если основное поле $\mathbb{k}$ алгебраически замкнуто¹, такое разложение описывается довольно явными формулами. Пусть $\deg f < \deg g$ и знаменатель дроби f/g имеет вид:

$$g(x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \prod (1 - \alpha_i x)^{m_i}, \quad (3-4)$$

где все числа $\alpha_i \in \mathbb{k}$ попарно различны.

УПРАЖНЕНИЕ 3.3. Убедитесь, что числа α_i из разложения (3-4) суть корни многочлена

$$t^n + a_1t^{n-1} + \dots + a_{n-1}t + a_n = \prod (t - \alpha_i)^{m_i}.$$

По предл. 3.1 и предл. 3.2 функция f/g является суммой простейших дробей

$$\frac{\beta_{ij}}{(1 - \alpha_i x)^{k_{ij}}}, \quad (3-5)$$

где при каждом i показатели k_{ij} лежат в пределах $1 \leq k_{ij} \leq m_i$, а $\beta_{ij} \in \mathbb{k}$.

Если все кратности $m_i = 1$, то разложение на простейшие дроби имеет вид

$$\frac{f(x)}{(1 - \alpha_1 x) \dots (1 - \alpha_n x)} = \frac{\beta_1}{1 - \alpha_1 x} + \dots + \frac{\beta_n}{1 - \alpha_n x}.$$

Чтобы найти β_i , умножим обе части на общий знаменатель и подставим $x = \alpha_i^{-1}$. Получим

$$\beta_i = \frac{f(\alpha_i^{-1})}{\prod_{v \neq i} (1 - (\alpha_v / \alpha_i))} = \frac{\alpha_i^{n-1} f(\alpha_i^{-1})}{\prod_{v \neq i} (\alpha_i - \alpha_v)}. \quad (3-6)$$

Мы заключаем, что когда все $m_i = 1$, дробь f/g является суммой $n = \deg g$ геометрических прогрессий:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum (\beta_1 \alpha_1^k + \beta_2 \alpha_2^k + \dots + \beta_n \alpha_n^k) \cdot x^k, \quad (3-7)$$

где β_i находятся по формулам (3-6).

Простейшая дробь (3-5) с показателем $k_{ij} = m > 1$ раскладывается в ряд при помощи формулы Ньютона для бинома с отрицательным показателем

$$\frac{1}{(1 - x)^m} = \sum_{k \geq 0} \frac{(k + m - 1) \dots (k + 2)(k + 1)}{(m - 1)!} \cdot x^k = \sum_{k \geq 0} \binom{k + m - 1}{m - 1} \cdot x^k, \quad (3-8)$$

которая получается $(m - 1)$ -кратным дифференцированием обеих частей разложения геометрической прогрессии $(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

УПРАЖНЕНИЕ 3.4. Убедитесь, что $\left(\frac{d}{dx}\right)^n (1 - x)^{-1} = n! / (1 - x)^{n+1}$.

Таким образом, разложение простейшей дроби (3-5) имеет вид

$$\frac{\beta}{(1 - \alpha_i x)^m} = \beta \sum_{k \geq 0} \alpha_i^k \binom{k + m - 1}{m - 1} \cdot x^k. \quad (3-9)$$

¹Т. е. каждый многочлен из $\mathbb{k}[x]$ полностью раскладывается в $\mathbb{k}[x]$ на линейные множители.

3.2.3. Решение линейных рекуррентных уравнений. Предыдущие вычисления можно использовать для отыскания «формулы k -того члена» последовательности z_k , заданной линейным рекуррентным уравнением n -того порядка:

$$z_k + a_1 z_{k-1} + a_2 z_{k-2} + \dots + a_n z_{k-n} = 0, \quad (3-10)$$

где коэффициенты $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ — заданные числа. При $k \geq n$ уравнению (3-10) удовлетворяют коэффициенты z_k любого степенного ряда вида

$$z_0 + z_1 x + z_2 x^2 + \dots = \frac{b_0 + b_1 x + \dots + b_{n-1} x^{n-1}}{1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n}.$$

Если в числителе правой части подобрать коэффициенты $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{C}$ так, чтобы первые n коэффициентов $z_0, \dots, z_{n-1}$ разложения полученной дроби в степенной ряд совпали с первыми n членами последовательности (3-10), то формулы (3-6) и (3-9) дадут явные выражения элементов последовательности z_k через k .

ПРИМЕР 3.6 (числа Фибоначчи)

Найдём явное выражение через k для элементов последовательности z_k , в которой

$$z_0 = 0, \quad z_1 = 1 \quad \text{и} \quad z_k = z_{k-1} + z_{k-2} \quad \text{при} \quad k \geq 2.$$

Рекуррентное уравнение $z_k - z_{k-1} - z_{k-2} = 0$ описывает коэффициенты ряда

$$x + z_2 x^2 + z_3 x^3 + \dots = \frac{b_0 + b_1 x}{1 - x - x^2},$$

у которого $z_0 = 0$ и $z_1 = 1$. Умножая обе части на знаменатель и сравнивая коэффициенты при x^0 и x^1 , заключаем, что $b_0 = 0$, а $b_1 = 1$. Таким образом,

$$z(x) = \frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{\beta_+}{1 - \alpha_+ x} + \frac{\beta_-}{1 - \alpha_- x},$$

где $\alpha_{\pm} = (1 \pm \sqrt{5})/2$ суть корни многочлена $t^2 - t - 1$, а $\beta_+ = -\beta_- = 1/(\alpha_+ - \alpha_-) = 1/\sqrt{5}$ по формуле (3-6). Разложение $z(x)$ в ряд имеет вид

$$\frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \alpha_+ x} - \frac{1}{1 - \alpha_- x} \right) = \sum_{k \geq 0} \frac{\alpha_+^k - \alpha_-^k}{\sqrt{5}} \cdot x^k,$$

т. е.

$$z_k = \frac{(1 + \sqrt{5})^k - (1 - \sqrt{5})^k}{2^k \sqrt{5}}.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.3

Если последовательность чисел $z_k \in \mathbb{C}$ удовлетворяет при $k \geq n$ рекуррентному уравнению

$$z_k + a_1 z_{k-1} + a_2 z_{k-2} + \dots + a_n z_{k-n} = 0 \quad (3-11)$$

с постоянными коэффициентами $a_i \in \mathbb{C}$, то $z_k = \alpha_1^k \varphi_1(k) + \dots + \alpha_r^k \varphi_r(k)$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ — это все различные корни многочлена¹

$$t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_n, \quad (3-12)$$

а $\varphi_i(x) \in \mathbb{C}[x]$ и $\deg \varphi_i$ строго меньше кратности соответствующего корня α_i .

¹Он называется *характеристическим многочленом* рекуррентного уравнения (3-10).

Доказательство. Ряд $\sum z_k x^k \in \mathbb{C}[[x]]$, коэффициенты которого решают уравнение (3-11), является суммой дробей вида $\beta(1 - \alpha x)^{-m}$, где α пробегает различные корни многочлена (3-12), показатель m лежит в пределах от 1 до кратности соответствующего корня α , и для каждой пары α, m комплексное число $\beta = \beta(\alpha, m)$ однозначно вычисляется по α, m и первым n коэффициентам последовательности z_k . Согласно формуле (3-9) коэффициент при x^k у разложения дроби $(1 - \alpha x)^{-m}$ в степенной ряд имеет вид $\alpha^k \varphi(k)$, где $\varphi(k) = \binom{k+m-1}{m-1}$ является многочленом степени $m - 1$ от k . $\square$

3.3. Логарифм и экспонента. Всюду в этом разделе мы рассматриваем ряды с коэффициентами в поле $\mathbb{k}$ характеристики $\text{char } \mathbb{k} = 0$. В этом случае для любого ряда $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ существует единственный ряд без свободного члена, производная от которого равна $f(x)$. Он называется *первообразной* или *интегралом* от f и обозначается

$$\int f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \frac{a_2}{3} x^3 + \dots = \sum_{k \geq 1} \frac{a_{k-1}}{k} x^k. \quad (3-13)$$

Первообразный ряд от знакопеременной геометрической прогрессии называется *логарифмом* и обозначается

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &\stackrel{\text{def}}{=} \int \frac{dx}{1+x} = \int (1 - x + x^2 - x^3 + \dots) dx = \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k. \end{aligned} \quad (3-14)$$

Единственный ряд со свободным членом 1, совпадающий со своей производной, называется *экспонентой* и обозначается

$$e^x \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k \geq 0} x^k / k! = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots \quad (3-15)$$

3.3.1. Логарифмирование и экспоненцирование. Обозначим через $N = (x) \subset \mathbb{k}[[x]]$ аддитивную абелеву группу всех рядов без свободного члена, а через $U = 1 + N \subset \mathbb{k}[[x]]$ — мультипликативную абелеву группу всех рядов с единичным свободным членом. Подстановка в аргумент логарифма вместо $1 + x$ произвольного ряда $u(x) \in U$ означает подстановку в логарифмический ряд (3-14) вместо переменной x ряда $u(x) - 1$ без свободного члена и тем самым является алгебраической операцией¹. Мы получаем отображение *логарифмирования*

$$\ln : U \rightarrow N, \quad u \mapsto \ln u. \quad (3-16)$$

УПРАЖНЕНИЕ 3.5. Убедитесь, что $\frac{d}{dx} \ln u = u' / u$ и $\ln(1/u) = -\ln u$ для всех $u \in U$.

Подстановка в экспоненту (3-15) вместо x любого ряда $\tau(x) \in N$ даёт ряд $e^{\tau(x)}$ со свободным членом 1. Мы получаем *экспоненциальное отображение*

$$\exp : N \rightarrow U, \quad \tau \mapsto e^\tau. \quad (3-17)$$

ЛЕММА 3.3

Для рядов $u, w \in U$ равенства $u = w$, $u' = w'$, $\ln(u) = \ln(w)$ и $u' / u = w' / w$ попарно эквивалентны друг другу.

¹См. н° 2.1.1 на стр. 36.

Доказательство. Первое равенство влечёт за собой все остальные. Поскольку ряды с равными свободными членами совпадают если и только если совпадают их производные, первые два равенства и последние два равенства равносильны друг другу. Остаётся показать, что из последнего равенства следует первое. Но последнее равенство утверждает, что $u'/u - w'/w = (u'w - w'u)/uw = (w/u) \cdot (u/w)' = 0$ откуда $(u/w)' = 0$, т. е. $u/w = \text{const} = 1$. $\square$

ТЕОРЕМА 3.2

Экспоненциальное и логарифмическое отображения (3-17) и (3-16) являются взаимно обратными изоморфизмами абелевых групп, т. е. для любых рядов u, u_1, u_2 из U и τ, τ_1, τ_2 из N выполняются тождества $\ln e^\tau = \tau$, $e^{\ln u} = u$, $\ln(u_1 u_2) = \ln(u_1) + \ln(u_2)$, $e^{\tau_1 + \tau_2} = e^{\tau_1} e^{\tau_2}$.

Доказательство. Равенство $\ln e^\tau = \tau$ проверяется сравнением производных от обеих частей:

$$(\ln e^\tau)' = \frac{(e^\tau)'}{e^\tau} = \frac{e^\tau \tau'}{e^\tau} = \tau',$$

а равенство $e^{\ln u} = u$ — сравнением логарифмических производных:

$$\frac{(e^{\ln u})'}{e^{\ln u}} = \frac{e^{\ln u} (\ln u)'}{e^{\ln u}} = \frac{u'}{u}.$$

Тем самым, экспоненцирование и логарифмирование являются взаимно обратными биекциями. Ряды $\ln(u_1 u_2)$ и $\ln u_1 + \ln u_2$ совпадают, поскольку имеют нулевые свободные члены и равные производные:

$$(\ln(u_1 u_2))' = \frac{(u_1 u_2)'}{u_1 u_2} = \frac{u_1' u_2 + u_1 u_2'}{u_1 u_2} = \frac{u_1'}{u_1} + \frac{u_2'}{u_2} = (\ln u_1 + \ln u_2)'.$$

Поэтому логарифмирование — гомоморфизм, а значит, и обратное к нему экспоненцирование — тоже. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 3.6. Докажите в $\mathbb{K}[[x, y]]$ равенство $e^{x+y} = e^x e^y$ непосредственным сравнением коэффициентов этих двух рядов.

3.3.2. Степенная функция и бином. Если $\text{char } \mathbb{K} = 0$, то для любого $\alpha \in \mathbb{K}$ определён биномиальный ряд с показателем α :

$$(1+x)^\alpha \stackrel{\text{def}}{=} e^{\alpha \ln(1+x)}.$$

Подставляя вместо $1+x$ произвольные ряды $u \in U$, мы для любого числа $\alpha \in \mathbb{K}$ получаем алгебраическую операцию возведения в α -тую степень $U \rightarrow U$, $u \mapsto u^\alpha$, обладающую всеми интуитивно ожидаемыми от степенной функции свойствами. А именно, для любых рядов $u, v \in U$ и чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ выполняются равенства

$$\begin{aligned} u^\alpha \cdot u^\beta &= e^{\alpha \ln u} e^{\beta \ln u} = e^{\alpha \ln u + \beta \ln u} = e^{(\alpha+\beta) \ln u} = u^{\alpha+\beta} \\ (u^\alpha)^\beta &= e^{\beta \ln(u^\alpha)} = e^{\beta \ln(e^{\alpha \ln u})} = e^{\alpha \beta \ln u} = u^{\alpha \beta} \\ (uv)^\alpha &= e^{\alpha \ln(uv)} = e^{\alpha (\ln u + \ln v)} = e^{\alpha \ln u + \alpha \ln v} = e^{\alpha \ln u} \cdot e^{\alpha \ln v} = u^\alpha v^\alpha. \end{aligned}$$

Например, для любого ряда u с единичным свободным членом ряд $u^{1/n}$ представляет собою $\sqrt[n]{u}$ в том смысле, что $(u^{1/n})^n = u$. Чтобы явно найти коэффициенты a_i биномиального ряда

$$(1+x)^\alpha = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

рассмотрим его логарифмическую производную

$$\frac{((1+x)^\alpha)'}{(1+x)^\alpha} = \frac{d}{dx} \ln(1+x)^\alpha = \alpha \frac{d}{dx} \ln(1+x) = \frac{\alpha}{1+x}.$$

Умножая левую и правую части на $(1+x)^{\alpha+1}$, получаем равенство

$$(a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots) \cdot (1+x) = \alpha \cdot (1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots).$$

Сравнивая коэффициенты при x^{k-1} в правой и левой части, приходим к рекуррентному соотношению $ka_k + (k-1)a_{k-1} = \alpha a_{k-1}$, из которого

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{\alpha - (k-1)}{k} \cdot a_{k-1} = \frac{(\alpha - (k-1))(\alpha - (k-2))}{k(k-1)} \cdot a_{k-2} = \dots \\ &= \frac{(\alpha - (k-1))(\alpha - (k-2)) \dots (\alpha - 1)\alpha}{k!}. \end{aligned}$$

Стоящая в правой части дробь имеет в числителе и знаменателе по k множителей, представляющих собою последовательно уменьшающиеся на единицу числа: в знаменателе — от k до 1, в числителе — от α до $(\alpha - k + 1)$. Эта дробь называется *биномиальным коэффициентом* и обозначается

$$\binom{\alpha}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \quad (3-18)$$

Таким образом, для любого $\alpha \in \mathbb{K}$ справедлива *формула Ньютона*

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k \geq 0} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \dots$$

ПРИМЕР 3.7 (БИНОМ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ)

Если $\alpha = n \in \mathbb{N}$, то при $k > n$ в числителе дроби (3-18) появится нулевой сомножитель. Поэтому разложение бинома в этом случае конечно и имеет вид

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 + \dots + x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^k,$$

знакомый нам из форм. (0-8) на стр. 7. При $\alpha = -m$, где $m \in \mathbb{N}$, мы получаем разложение из форм. (3-8) на стр. 57

$$(1+x)^{-m} = 1 - mx + \frac{m(m+1)}{2} x^2 - \frac{m(m+1)(m+2)}{6} x^3 + \dots = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \binom{k+m-1}{k} \cdot x^k.$$

При $\alpha = 1/n$, где $n \in \mathbb{N}$, формула Ньютона разворачивает в степенной ряд радикал

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1+x} &= 1 + \frac{1}{n} x + \frac{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - 1 \right)}{2} x^2 + \frac{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \left(\frac{1}{n} - 2 \right)}{6} x^3 + \dots = \\ &= 1 + \frac{x}{n} - \frac{n-1}{2} \cdot \frac{x^2}{n^2} + \frac{(n-1)(2n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \frac{x^3}{n^3} - \frac{(n-1)(2n-1)(3n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{x^4}{n^4} + \dots \end{aligned}$$

Например, при $n = 2$ и $k \geq 1$ в качестве коэффициента при x^k получается дробь

$$(-1)^{k-1} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k-3)}{2^k k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{2k} \cdot \frac{1}{4^{k-1}} \cdot \binom{2k-2}{k-1},$$

т. е.

$$\sqrt{1+x} = 1 + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{2k} \cdot \binom{2k-2}{k-1} \cdot \frac{x^k}{4^{k-1}}. \quad (3-19)$$

ПРИМЕР 3.8 (числа КАТАЛАНА)

Воспользуемся разложением (3-19) для получения явной формулы для чисел Каталана, часто возникающих в комбинаторных задачах. Вычислим произведение $n+1$ чисел

$$a_0 a_1 \dots a_n, \quad (3-20)$$

делая за один шаг ровно одно из n умножений и заключая перемножаемые числа в скобки. В результате мы расставим n пар скобок в выражении (3-20). Количество различных расстановок скобок, возникающих таким образом, называется n -ым числом Каталана c_n . При $n = 1$ есть лишь одна расстановка скобок $(a_0 a_1)$, при $n = 2$ — две $(a_0(a_1 a_2))$ и $((a_0 a_1)a_2)$, при $n = 3$ — пять: $(a_0(a_1(a_2 a_3)))$, $(a_0((a_1 a_2)a_3))$, $((a_0 a_1)(a_2 a_3))$, $((a_0(a_1 a_2))a_3)$, $((a_0 a_1)a_2)a_3$. Множество всевозможных расстановок скобок в произведении (3-20) распадается в дизъюнктное объединение n подмножеств, в которых конфигурации наружных скобок имеют вид

$$(a_0(a_1 \dots a_n)), ((a_0 a_1)(a_2 \dots a_n)), \dots, ((a_0 \dots a_{n-2})(a_{n-1} a_n)), ((a_0 \dots a_{n-1})a_n)$$

и которые состоят, соответственно, из c_{n-1} , $c_1 c_{n-2}$, $c_2 c_{n-3}$, $\dots$, $c_{n-2} c_1$, $c_{n-1} c_0$ элементов. Если дополнить последовательность чисел Каталана числом $c_0 \stackrel{\text{def}}{=} 1$, то получится соотношение

$$c_n = c_0 c_{n-1} + c_1 c_{n-2} + \dots + c_{n-2} c_1 + c_{n-1} c_0,$$

означающее, что ряд Каталана $c(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k \geq 0} c_k x^k = 1 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots \in \mathbb{Z}[[x]]$ удовлетворяет уравнению $c(x)^2 = (c(x) - 1)/x$, т. е. является лежащим в кольце $\mathbb{Z}[[x]]$ корнем квадратного трёхчлена $xt^2 - t - 1 = 0$ от переменной t . В поле рядов Лорана $\mathbb{Q}((x)) \supset \mathbb{Z}[[x]]$ корни находятся по стандартной школьной формуле $t = (1 \pm \sqrt{1 - 4x})/2x$. Так как $1 + \sqrt{1 - 4x}$ не делится на $2x$ в $\mathbb{Z}[[x]]$, корень $(1 + \sqrt{1 - 4x})/(2x) \notin \mathbb{Z}[[x]]$. Тем самым, $c(x) = (1 - \sqrt{1 - 4x})/(2x)$, откуда по формуле (3-19)

$$c_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}.$$

Отметим, что даже не сразу понятно, что это число — целое.

3.4. Действие $\mathbb{Q}[[d/dt]]$ на $\mathbb{Q}[t]$. Рассмотрим кольцо формальных степенных рядов $\mathbb{Q}[[x]]$ от переменной x и кольцо многочленов $\mathbb{Q}[t]$ от переменной t . Обозначим через

$$D = \frac{d}{dt} : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t], \quad g \mapsto g',$$

оператор дифференцирования. Оператор D можно подставить вместо переменной x в любой степенной ряд $\Phi(x) = \sum_{k \geq 0} \varphi_k x^k \in \mathbb{Q}[[x]]$. Результатом такой подстановки, по определению, является линейное отображение

$$\Phi(D) : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t], \quad f \mapsto \sum_{k \geq 0} \varphi_k D^k f = \varphi_0 f + \varphi_1 f' + \varphi_2 f'' + \dots \quad (3-21)$$

Поскольку каждое дифференцирование уменьшает степень многочлена на единицу, все слагаемые в правой части (3-21) обратятся в нуль при $k > \deg f$. Таким образом, для каждого многочлена $f \in \mathbb{Q}[t]$, правая часть (3-21) является корректно определённым многочленом, каждый коэффициент которого вычисляется конечным числом действий с коэффициентами исходного многочлена f и первыми $\deg(f)$ коэффициентами ряда Φ . Линейность отображения (3-21) означает, что $\Phi(D)(\alpha f + \beta g) = \alpha \Phi(D)f + \beta \Phi(D)g$ для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ и $f, g \in \mathbb{Q}[t]$. Результатом подстановки оператора D в произведение рядов $\Phi(x)\Psi(x) \in \mathbb{Q}[[x]]$ является композиция $\Phi(D) \circ \Psi(D) = \Psi(D) \circ \Phi(D)$ отображений $\Phi(D)$ и $\Psi(D)$.

УПРАЖНЕНИЕ 3.7. Убедитесь в этом.

Таким образом, все отображения вида $\Phi(D)$ перестановочны друг с другом, и для биективности отображения $\Phi(D)$ необходимо и достаточно, чтобы степенной ряд $\Phi(x)$ был обратим¹ в кольце $\mathbb{Q}[[x]]$. В силу линейности значение отображения $\Phi(D)$ на произвольном многочлене выражается через его значения $\Phi_m(t) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(D)t^m$ на базисных одночленах t^m :

$$\Phi(D)(a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n) = a_0 + a_1 \Phi_1(t) + \dots + a_n \Phi_n(t).$$

Многочлен $\Phi_m(t) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(D)t^m$ называется m -тым *многочленом Аппеля* ряда Φ . Его степень не превосходит m , а коэффициенты зависят лишь от первых $m + 1$ коэффициентов ряда Φ .

ПРИМЕР 3.9 (ОПЕРАТОРЫ СДВИГА)

Экспонента $e^D = 1 + D + D^2/2 + D^3/6 + \dots$ имеет многочлены Аппеля

$$e^D t^m = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} D^k t^m = \sum_{k \geq 0} \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{k!} t^{m-k} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} t^{m-k} = (t+1)^m.$$

Поэтому $e^D : f(t) \mapsto f(t+1)$ — это *оператор сдвига*. Так как ряды e^x и e^{-x} обратны друг другу в $\mathbb{Q}[[x]]$, операторы e^D и e^{-D} тоже обратны друг другу, т. е. $e^{-D} : f(t) \mapsto f(t-1)$.

УПРАЖНЕНИЕ 3.8. Убедитесь, что $e^{\alpha D} : f(t) \mapsto f(t+\alpha)$ при любом $\alpha \in \mathbb{Q}$.

ПРИМЕР 3.10 (ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ СТЕПЕНЕЙ)

Для произвольно зафиксированного $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ рассмотрим сумму

$$S_m(n) \stackrel{\text{def}}{=} 0^m + 1^m + 2^m + 3^m + \dots + n^m = \sum_{k=0}^n k^m \quad (3-22)$$

как функцию от n . При $m = 0, 1, 2, 3$ функции $S_m(n)$ достаточно известны:

$$\begin{aligned} S_0(n) &= 1 + \dots + 1 = n \\ S_1(n) &= 1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2 \\ S_2(n) &= 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6 \\ S_3(n) &= 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = n^2(n+1)^2/4 = S_1(n)^2. \end{aligned} \quad (3-23)$$

Чтобы получить для $S_m(t)$ явное выражение, применим к этой функции *разностный оператор*

$$\nabla : \varphi(t) \mapsto \varphi(t) - \varphi(t-1).$$

¹Т. е. имел ненулевой свободный член, см. прим. 2.2 на стр. 37.

Функция $\nabla S_m(t)$ принимает при всех $t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ те же значения, что и многочлен t^m . Если существует такой многочлен $S_m(t) \in \mathbb{Q}[t]$, что $S_m(0) = 0$ и $\nabla S_m(t) = t^m$, то его значения в точках $t = 0, 1, 2, \dots$ последовательно вычисляются, начиная с $S_m(0) = 0$, по формуле

$$S_m(n) = S_m(n-1) + \nabla S_m(n) = S_m(n-1) + n^m$$

и совпадают с суммами (3-22). Покажем, что уравнение $\nabla S_m(t) = t^m$ имеет в $\mathbb{Q}[t]$ единственное решение $S_m(t)$ с $S_m(0) = 0$. Согласно [прим. 3.9](#) оператор $\nabla : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t]$ имеет вид

$$\nabla = 1 - e^{-D} = \frac{1 - e^{-D}}{D} \circ D.$$

Ряд $(1 - e^{-x})/x$ имеет свободный член 1 и обратим в $\mathbb{Q}[[x]]$. Обратный ему ряд

$$\text{td}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x}{1 - e^{-x}} \in \mathbb{Q}[[x]]$$

называется *рядом Тодда*. Подставляя $x = D$ в равенство $\text{td}(x) \cdot (1 - e^{-x}) = x$, получаем соотношение $\text{td}(D) \circ \nabla = D$. Стало быть, $DS_m(t) = \text{td}(D)\nabla S_m(t) = \text{td}(D)t^m = \text{td}_m(t)$ является многочленом Аппеля ряда Тодда, а искомый нами многочлен $S_m(t) = \int \text{td}_m(t) dt$ получается из него интегрированием. Запишем ряд Тодда в «экспоненциальной форме»

$$\text{td}(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} x^k. \quad (3-24)$$

Тогда сумма m -тых степеней первых t натуральных чисел равна

$$\begin{aligned} S_m(t) &= \int \left(\sum_{k=0}^m \frac{a_k}{k!} D^k t^m \right) dt = \int \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a_k t^{m-k} \right) dt = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \frac{a_k t^{m-k+1}}{m-k+1} = \\ &= \frac{1}{m+1} \left(\binom{m+1}{1} a_m t + \binom{m+1}{2} a_{m-1} t^2 + \dots + \binom{m+1}{m} a_1 t^m + \binom{m+1}{m+1} a_0 t^{m+1} \right). \end{aligned}$$

Эту формулу часто символически пишут в виде

$$(m+1) \cdot S_m(t) = (a^\downarrow + t)^{m+1} - a_{m+1},$$

где стрелка у $a^\downarrow$ предписывает при раскрытии бинома $(a+t)^{m+1}$ заменять a^k на a_k . Коэффициенты a_k рекурсивно вычисляются из равенства $\text{td}(x) \cdot (1 - e^{-x})/x = 1$, которое имеет вид

$$\left(1 + a_1 x + \frac{a_2}{2} x^2 + \frac{a_3}{6} x^3 + \frac{a_4}{24} x^4 + \dots \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{24} x^3 + \frac{1}{120} x^4 - \dots \right) = 1.$$

УПРАЖНЕНИЕ 3.9. Найдите первую дюжину чисел a_k , проверьте формулы (3-23), дополните их явными формулами для $S_4(n)$ и $S_5(n)$ и вычислите¹ $S_{10}(1000)$.

¹Яков Бернулли (1654–1705), пользуясь лишь пером и бумагой, сложил 10-е степени первой тысячи натуральных чисел примерно за 7 минут, о чём не без гордости написал в своём манускрипте «Ars Conjectandi», изданном в 1713 году уже после его кончины.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.1. (числа Бернулли) Название «ряд Тодда» вошло в обиход во второй половине XX века после работ Хирцебруха и Гротендика, где он использовался для формулировки и доказательства теоремы Римана – Роха. Во времена Бернулли и Эйлера предпочитали пользоваться рядом $td(-x) = x/(e^x - 1)$, который отличается от $td(x)$ ровно в одном члене, поскольку

$$td(x) - td(-x) = \frac{x}{1 - e^{-x}} + \frac{x}{1 - e^x} = x \cdot \frac{2 - e^x - e^{-x}}{(1 - e^{-x}) \cdot (1 - e^x)} = x.$$

Тем самым, коэффициенты при x в $td(x)$ и в $td(-x)$ равны соответственно $1/2$ и $-1/2$, а все прочие коэффициенты при нечётных степенях x^{2k+1} с $k \geq 1$ в обоих рядах нулевые. Коэффициенты B_k в экспоненциальном представлении

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k \geq 0} \frac{B_k}{k!} x^k$$

называются *числами Бернулли*. Таким образом, $B_k = a_k$ при $k \neq 1$ и обращаются в нуль при всех нечётных $k \geq 3$, а $B_1 = -a_1 = -1/2$. Со времён своего открытия числа Бернулли вызывают неослабевающий интерес. Им посвящена обширная литература¹ и специальный интернет-ресурс², на котором среди прочего есть программа для быстрого вычисления чисел B_k в виде несократимых рациональных дробей. Однако, не смотря на множество красивых теорем о числах Бернулли, про явную зависимость B_n от n известно немного, и любой содержательный новый взгляд в этом направлении был бы интересен.

УПРАЖНЕНИЕ 3.10. Получите для чисел Бернулли рекурсивную формулу

$$(n+1)B_n = - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} \cdot B_k.$$

¹Начать знакомство с которой я советую с гл. 15 книги К. Айрлэнд, М. Роузен. «Классическое введение в современную теорию чисел» и § 8 гл. V книги З. И. Борович, И Р. Шафаревич. «Теория чисел».

²<http://www.bernoulli.org/>

Ответы и указания к некоторым упражнениям

Упр. 3.1. Воспользуйтесь [лем. 3.1](#).

Упр. 3.2. По [теор. 3.1](#) на стр. 54 эпиморфизм $\pi : K = \mathbb{Z}/(30) \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/(15)$, $[n]_{30} \mapsto [n]_{15}$, раскладывается в композицию гомоморфизма $\iota_S : K \rightarrow KS^{-1}$ и гомоморфизма

$$\pi_S : KS^{-1} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/(15), \quad [m]_{30}/[2^k]_{30} \mapsto [m]_{15}[2^k]_{15}^{-1},$$

сюръективного в силу сюръективности π . Если $[m]_{30}/[2^k]_{30} \in \ker \pi_S$, то $[m]_{15} = 0$, а значит, $[m]_{30}/[2^k]_{30} = [2m]_{30}/[2^{k+1}]_{30} = 0$ в KS^{-1} . Тем самым, $\ker \pi_S = 0$ и π_S инъективен.

Упр. 3.4. По правилу дифференцирования композиции $(f^m)' = mf^{m-1}f'$, откуда

$$\frac{d}{dx}(1-x)^{-m} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right)^m = m(1-x)^{-(m+1)}.$$

Нужная формула получается отсюда по индукции.

Упр. 3.5. Первое равенство вытекает из правила дифференцирования сложной функции¹, второе доказывается дифференцированием обеих частей.

Упр. 3.9. Ответы: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{6}$, $a_3 = 0$, $a_4 = -\frac{1}{30}$, $a_5 = 0$, $a_6 = \frac{1}{42}$, $a_7 = 0$, $a_8 = -\frac{1}{30}$, $a_9 = 0$, $a_{10} = \frac{5}{66}$, $a_{11} = 0$, $a_{12} = -\frac{691}{2730}$,

$$S_4(n) = n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)/30$$

$$S_5(n) = n^2(n+1)^2(2n+1)(2n^2+2n-1)/12$$

$$S_{10}(1000) = 91\,409\,924\,241\,424\,243\,424\,241\,924\,242\,500.$$

Упр. 3.10. Подставьте $t = 1$ в $(m+1)S_m(t) = (a^\downarrow + t)^{m+1} - a_{m+1}$.

¹См. формулу (2-8) на стр. 38.