

§4. Связи между представлениями группы и её погрупп.

Всюду в этом параграфе мы продолжаем по умолчанию считать, что G — конечная группа, $\mathbb{k}$ — алгебраически замкнутое поле, и $\text{char}(\mathbb{k}) \nmid |G|$.

4.1. Кольцо представлений произведения групп. Согласно сл. 3.10 на стр. 32 классы изоморфных представлений группы G биективно соответствуют характерам, и каждый характер является линейной комбинацией неприводимых характеров с неотрицательными целыми коэффициентами, равными кратностям вхождения соответствующих неприводимых подмодулей в рассматриваемое представление. По лем. 3.2 на стр. 30 прямым суммам и тензорным произведениям представлений отвечает сложение и умножение их характеров. Обе эти операции над представлениями коммутативны в том смысле, что представления $U \otimes W$ и $W \otimes U$ изоморфны и тем самым лежат в одном классе, и то же самое относится к представлениям $U \oplus W$ и $W \oplus U$. Также имеет место дистрибутивность: $(U \oplus W) \otimes V \simeq (U \otimes V) \oplus (W \otimes V)$ для любых G -модулей U, V, W . Это позволяет расширить множество классов изоморфных представлений до коммутативного кольца с единицей, которое обозначается R_G и называется *кольцом представлений* группы G . По определению, элементами этого кольца являются формальные целочисленные линейные комбинации неприводимых характеров, т. е. как абелева группа по сложению кольцо R_G представляет собой свободный $\mathbb{Z}$ -модуль с базисом из неприводимых характеров. Элементы кольца R_G , содержащие отрицательные кратности неприводимых характеров, называются *виртуальными представлениями*. Линейные комбинации неприводимых характеров с натуральными коэффициентами взаимно однозначно соответствуют «настоящим» ненулевым G -модулям, рассматриваемым с точностью до изоморфизма. Тензорное умножение «настоящих» G -модулей однозначно распространяется до $\mathbb{Z}$ -билинейного коммутативного ассоциативного умножения $R_G \times R_G \rightarrow R_G$. Нулём кольца R_G является тривиальное представление группы G в нулевом векторном пространстве 0, единицей — тривиальное одномерное представление $\mathbb{1}$.

Пример 4.1 ($R_{D_4} \simeq R_{Q_8}$)

Не изоморфные конечные группы могут иметь изоморфные кольца представлений. Например, группа квадрата D_4 и группа кватернионных единиц Q_8 имеют одинаковые таблицы неприводимых характеров:

группа:	представители классов:				
Q_8	1	-1	i	j	k
D_4	Id	-Id	σ	τ	$\sigma\tau$
# эл-тов в классе	1	1	2	2	2
значения характеров:					
V_{++}	1	1	1	1	1
V_{+-}	1	1	1	-1	-1
V_{-+}	1	1	-1	1	-1
V_{--}	1	1	-1	-1	1
2-мерный	2	-2	0	0	0

и стало быть, одинаковые кольца представлений. Четыре одномерных характера отвечают представлениям, в которых отражения относительно одной пары перпендикулярных осей квадрата и повороты на $\pm 90^\circ$ (соответственно $\pm i$ и $\pm j$) действуют умножениями на ± 1 со всеми возможными сочетаниями знаков. В нижней строке таблицы написан характер тавтологического двумерного представления группы квадрата (соответственно тавтологического представления

кватернионных единиц

$$\pm e = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm i = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm j = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm k = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

рассматриваемых как элементы вещественной подалгебры¹ $\mathbb{H} \subset \text{Mat}_2(\mathbb{C})$, в координатном пространстве $\mathbb{C}^2$.)

4.1.1. Внешнее тензорное произведение. Из линейных представлений $\mu : G \rightarrow \text{GL}(U)$ и $\nu : H \rightarrow \text{GL}(W)$ групп G и H можно изготовить линейное представление группы $G \times H$ в пространстве $U \otimes W$, в котором каждый элемент $(g, h) \in G \times H$ действует оператором

$$\mu_g \otimes \nu_h : u \otimes w \mapsto \mu_g(u) \otimes \nu_h(w).$$

Это представление обозначается $\mu \boxtimes \nu : G \times H \rightarrow \text{GL}(U \otimes W)$, $(g, h) \mapsto \mu_g \otimes \nu_h$, и называется *внешним тензорным произведением* представлений μ и ν . Его не следует путать с тензорным произведением представлений одной и той же группы, обсуждавшимся в [прим. 2.3](#) на стр. 13.

УПРАЖНЕНИЕ 4.1. Убедитесь, что характеры представлений λ , μ и $\lambda \boxtimes \mu$ связаны соотношением $\chi_{\lambda \boxtimes \mu}((g, h)) = \chi_\lambda(g) \chi_\mu(h)$ для всех $g \in G$, $h \in H$.

ТЕОРЕМА 4.1

Пусть H — конечная, а G — произвольная группы, и основное поле $\mathbb{k}$ алгебраически замкнуто, причём $\text{char } \mathbb{k} \nmid |H|$. Тогда каждое конечномерное неприводимое представление группы $G \times H$ является внешним произведением некоторых неприводимых представлений групп G и H , и наоборот, внешнее тензорное произведение любых двух конечномерных неприводимых представлений групп G и H является неприводимым представлением группы $G \times H$.

Доказательство. Пусть $\varrho : G \times H \rightarrow \text{GL}(V)$ — конечномерное неприводимое представление. Рассмотрим его как H -модуль, на котором каждый элемент $h \in H$ действует оператором $\varrho_{(e, h)}$. Поскольку элементы (g, e) и (e, h) коммутируют друг с другом при всех $g \in G$ и $h \in H$, все операторы $\varrho_{(g, e)}$ переводят в себя каждую изотипную компоненту² H -модуля V , вполне приводимого в силу условий, наложенных на H и $\mathbb{k}$. Мы заключаем, что каждая H -изотипная компонента является $G \times H$ -подмодулем в V . В силу неприводимости V такая компонента всего одна, и по [предл. 1.4](#) на стр. 11 она имеет вид $\text{Hom}_H(W, V) \otimes W$ для некоторого простого H -модуля W , т. е. V как H -модуль является тензорным произведением тривиального представления группы H в пространстве $\text{Hom}_H(W, V)$ и некоторого неприводимого представления $\mu : H \rightarrow \text{GL}(W)$. На пространстве $\text{Hom}_H(W, V)$ имеется естественное действие $\lambda : G \rightarrow \text{GL}(\text{Hom}_H(W, V))$ группы G по правилу $\lambda_g : \varphi \mapsto \varrho_{(g, e)} \circ \varphi$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.2. Убедитесь, что для любого перестановочного с действием группы H линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$ и любого $g \in G$ композиция $\varrho_{(g, e)} \circ \varphi : V \rightarrow V$ тоже перестановочна с действием H .

Таким образом на пространстве $\text{Hom}_H(W, V) \otimes W$ имеется структура $G \times H$ -модуля, изоморфного внешнему тензорному произведению $\lambda \boxtimes \mu$, и изоморфизм из [предл. 1.4](#)

$$c_{VW} : \text{Hom}_H(W, V) \otimes W \xrightarrow{\sim} V, \quad \varphi \otimes w \mapsto \varphi(w)$$

¹См. раздел 17.1 на с. 264 лекций [\[Алг 1\]](#).

²См. [предл. 1.2](#) на стр. 10.

является изоморфизмом $G \times H$ -модулей. Так как каждое G -инвариантное подпространство $U \subset \text{Hom}_H(W, V)$ задаёт $G \times H$ -инвариантное подпространство $c_{VW}(U \otimes W) \subset V$, а $G \times H$ -модуль V неприводим, мы заключаем, что G -модуль $\text{Hom}_G(W, V)$ неприводим, т. е. $\varrho = \lambda \boxtimes \mu$ является внешним тензорным произведением неприводимых представлений.

Наоборот, пусть даны неприводимые представления $\lambda : G \rightarrow \text{GL}(U)$ и $\mu : H \rightarrow \text{GL}(W)$. Рассмотрим $U \otimes W$ как тензорное произведение тривиального представления группы H в пространстве U и представления μ . Выберем в U базис $u_1, \dots, u_n$. Тогда G -модуль $U \otimes W$ распадётся в прямую сумму n подмодулей $\mathbb{K}u_i \otimes W \simeq W$ и любой вектор $v \in U \otimes W$ однозначно представится в виде $v = \sum u_i \otimes w_i$ с $w_i \in W$, причём все отображения $\xi_i : W \otimes U \rightarrow U, v \mapsto w_i$, будут гомоморфизмами G -модулей. Из этого вытекает, что каждый неприводимый H -подмодуль в $U \otimes W$ имеет вид $u \otimes W$ для некоторого вектора $u \in U$. В самом деле, поскольку $U \otimes W$ является W -изотипным G -подмодулем, каждый его неприводимый подмодуль $V \subset U \otimes W$ изоморфен W . Зафиксирует такой изоморфизм $\varphi : V \xrightarrow{\sim} W$. По лемме Шура над алгебраически замкнутым полем¹ пространство $\text{Hom}_G(V, W)$ одномерно с базисом φ . Поэтому ограничение каждой проекции ξ на V имеет вид $\xi|_V = x_i \varphi$ для некоторых $x_i \in \mathbb{K}$. Тем самым любой вектор $v \in V$ имеет вид $v = \sum u_i \otimes (x_i \varphi(v)) = (\sum x_i u_i) \otimes \varphi(v)$, т. е. лежит в неприводимом подмодуле $u \otimes W$, где $u = \sum x_i u_i$. Теперь рассмотрим ненулевой $G \times H$ -подмодуль $L \subset U \otimes W$. Подпространство L инвариантно относительно описанного выше действия H на $U \otimes W$ и содержит какой-нибудь ненулевой неприводимый H -подмодуль², по предыдущему равный $u \otimes W$ для некоторого $u \in U$. Для каждого $w \in W$ положим $U_w = \{v \in U \mid v \otimes w \in L\}$. Это G -инвариантное подпространство в U , поскольку $\lambda_g(v) \otimes w = \lambda_g \otimes \varrho_e(v \otimes w) \in L$, коль скоро $v \otimes w \in L$. Так как каждое подпространство U_w содержит ненулевой вектор u , все эти подпространства совпадают с U в силу неприводимости U . Тем самым, $v \otimes w \in L$ для всех $v \in U$ и $w \in W$, т. е. $L = U \otimes W$. $\square$

4.1.2. Тензорные произведения коммутативных колец. Из любых двух коммутативных колец A и B с единицами можно изготовить коммутативное кольцо $A \otimes B$, которое как абелева группа по сложению является тензорным произведением³ $A \otimes_{\mathbb{Z}} B$ аддитивных абелевых групп⁴ колец A и B , а умножение разложимых тензоров задаётся правилом

$$(a_1 \otimes b_1) \cdot (a_2 \otimes b_2) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 a_2) \otimes (b_1 b_2)$$

и по $\mathbb{Z}$ -линейности продолжается на все остальные тензоры. Нулём кольца $A \otimes B$ является $0 \otimes 0$, единицей — $1 \otimes 1$. Отображения

$$\iota_A : A \rightarrow A \otimes B, a \mapsto a \otimes 1, \quad \text{и} \quad \iota_B : B \rightarrow A \otimes B, b \mapsto 1 \otimes b,$$

являются гомоморфизмами колец и обладает следующим универсальным свойством: для любых гомоморфизмов колец $\alpha : A \rightarrow C$ и $\beta : B \rightarrow C$ существует единственный такой гомоморфизм колец $\alpha \otimes \beta : A \otimes B \rightarrow C$, что $\alpha = (\alpha \otimes \beta) \circ \iota_A$ и $\beta = (\alpha \otimes \beta) \circ \iota_B$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.3. Выведите это свойство из универсального свойства тензорного произведения $\mathbb{Z}$ -модулей и покажите, что оно определяет кольцо $A \otimes B$ и гомоморфизмы ι_A, ι_B однозначно с точностью до единственного перестановочного с ними изоморфизма.

¹См. сл. 1.2 на стр. 7.

²Сгодится, например, любой H -подмодуль минимальной положительной размерности.

³См. раздел 13.1 на с. 210 лекций [Алг 1].

⁴Или, что то же самое, модулей над $\mathbb{Z}$, см. пример 5.4 на с. 83 лекций [Алг 1].

Следствие 4.1

Для любых двух конечных групп G, H и алгебраически замкнутого поля $\mathbb{k}$, над которым рассматриваются все представления и характеристика которого не делит ни $|G|$, ни $|H|$, отображение $R_G \otimes R_H \simeq R_{G \times H}$, $\lambda \otimes \mu \mapsto \lambda \boxtimes \mu$, является изоморфизм колец.

Доказательство. По [упр. 4.1](#) на стр. 35 отображения

$$\alpha : R_G \rightarrow R_{G \times H}, \lambda \mapsto \lambda \boxtimes \mathbb{1}_H \quad \text{и} \quad \beta : R_H \rightarrow R_{G \times H}, \mu \mapsto \mathbb{1}_G \boxtimes \mu,$$

где $\mathbb{1}_G$ и $\mathbb{1}_H$ — тривиальные одномерные представления групп G и H , являются гомоморфизмами колец, и правило $\lambda \otimes \mu \mapsto \lambda \boxtimes \mu$ задаёт их подъём до гомоморфизма $R_G \otimes R_H \simeq R_{G \times H}$. Его биективность вытекает из того, что тензорным произведением свободных $\mathbb{Z}$ -модулей с базисами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ и $\mu_1, \dots, \mu_m$ является свободный $\mathbb{Z}$ -модуль с базисом¹ $\lambda_i \otimes \mu_j$, и по [теор. 4.1](#) неприводимые представления группы $G \times H$ имеют вид $\lambda_i \boxtimes \mu_j$, где λ_i и μ_j независимо пробегают неприводимые представления групп G и H . $\square$

4.2. Индуцированные модули. Пусть ассоциативная $\mathbb{k}$ -алгебра A с единицей является подалгеброй ассоциативной $\mathbb{k}$ -алгебры B с той же единицей, что и в A . Тогда любое представление W алгебры B одновременно является и представлением алгебры A . Пространство W , рассматриваемое как модуль над A , называется *ограничением B -модуля W на A* и обозначается $\text{res } W$ или $\text{res}_A^B W$, если важно указать, о каких B и A идёт речь.

Простейшим примером этой ситуации является о веществлении комплексного векторного пространства²: если $A = \mathbb{k} = \mathbb{R}$, а $B = \mathbb{C}$, то n -мерное векторное пространство W над полем $\mathbb{C}$ может рассматриваться как вещественное векторное пространство $W_{\mathbb{R}} = \text{res}_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}} W$ размерности $2n$.

Наоборот, по любому A -модулю V можно построить B -модуль $\text{ind}_A^B V = B \otimes_A V$, который называется *индуцированным с A -модуля V* и часто обозначается просто $\text{ind } V$, если понятно о каких A и B речь. Он определяется как фактор тензорного произведения векторных пространств $B \otimes_{\mathbb{k}} V$ по подпространству, порождённому всевозможными разностями

$$ba \otimes v - b \otimes av, \quad \text{где } b \in B, a \in A, v \in V.$$

По построению, в пространстве $B \otimes_A V$ выполняются равенства $ba \otimes_A v = b \otimes_A av$, т. е. элементы алгебры A «проносятся» через знак тензорного произведения. Поэтому такое произведение называется *тензорным произведением над A* . Структура модуля над B задаётся правилом³

$$b(b' \otimes v) \stackrel{\text{def}}{=} (bb') \otimes v.$$

Простейшим примером этой ситуации является комплексификация вещественного векторного пространства: если $\mathbb{k} = A = \mathbb{R}$, а $B = \mathbb{C}$, то из n -мерного вещественного векторного пространства V можно изготовить комплексное векторное пространство $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ той же размерности n , но уже над полем $\mathbb{C}$.

¹См. предложение 13.3 на с. 213 лекций [\[Алг 1\]](#).

²См. раздел 15.1 на с. 242 лекций [\[Алг 1\]](#).

³Ср. с разделом 13.5 на с. 220 лекций [\[Алг 1\]](#).

Предложение 4.1

Отображение $\tau_A : V \rightarrow B \otimes_A V$, $v \mapsto 1 \otimes_A v$, является гомоморфизмом A -модулей, и для перестановочного с действием A гомоморфизма $\varphi : V \rightarrow W$ в любой B -модуль W существует единственный такой гомоморфизм B -модулей $\psi : B \otimes_A V \rightarrow W$, что $\psi \circ \tau_A = \varphi$. Иначе говоря, для всех A -модулей V и B -модулей W имеется канонический изоморфизм

$$\mathrm{Hom}_B(\mathrm{ind} V, W) \simeq \mathrm{Hom}_A(V, \mathrm{res} W), \quad \psi \mapsto \psi \circ \tau_A. \quad (4-1)$$

Доказательство. Для каждого гомоморфизма B -модулей $\psi : B \otimes_A U \rightarrow V$ композиция

$$\varphi = \psi \circ \tau_A : V \rightarrow W, \quad v \mapsto \psi(1 \otimes_A u),$$

является гомоморфизмом A -модулей, поскольку $\varphi(av) = \psi(1 \otimes_A av) = \psi(a \otimes_A v) = a\psi(1 \otimes_A v) = a\varphi(v)$. Тем самым, отображение (4-1) определено корректно. Для данного гомоморфизма A -модулей $\varphi : V \rightarrow W$ такой гомоморфизм B -модулей $\psi : B \otimes_A V \rightarrow W$, что $\varphi = \psi \circ \tau_A$, обязан действовать на разложимые тензоры по правилу $b \otimes v \mapsto b\varphi(v)$. Тем самым, он единствен. Будучи билинейным по b и v , это правило корректно задаёт линейный оператор $B \otimes V \rightarrow W$, который переводит соотношения $ba \otimes v - b \otimes av$ в нуль, ибо $ba\psi(v) - b\psi(av) = 0$ в силу A -линейности ψ . Поэтому он корректно спускается до линейного отображения $B \otimes_A V \rightarrow W$, перестановочность которого с левым умножением на элементы $b \in B$ очевидна. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.4. Убедитесь, что универсальное свойство из [предл. 4.1](#) определяет B -модуль $B \otimes_A V$ вместе с A -линейным отображением τ_A однозначно с точностью до единственного B -линейного изоморфизма, перестановочного с τ_A , и проверьте, что ограничение и индуцирование представлений перестановочны с прямыми суммами и с тензорными произведениями представлений.

4.2.1. Индуцированные представления групп. В ситуации, когда $B = \mathbb{k}G$ и $A = \mathbb{k}H$ являются групповыми алгебрами конечной группы G и какой-нибудь её подгруппы $H \subset G$, ограничение и индуцирование сопоставляют каждому линейному представлению $\varrho : G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$ его *ограничение* $\mathrm{res} \varrho \stackrel{\mathrm{def}}{=} \varrho|_H : H \rightarrow \mathrm{GL}(W)$ на подгруппу H , а каждому линейному представлению $\lambda : H \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ — *индуцированное* им представление $\mathrm{ind} \lambda : G \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V)$ группы G так, что имеет место канонический изоморфизм

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{ind} V, W) \simeq \mathrm{Hom}_H(V, \mathrm{res} W). \quad (4-2)$$

Если нужно подчеркнуть, о каких G и $H \subset G$ идёт речь, мы пишем res_H^G и ind_H^G .

Предложение 4.2 (взаимность Фробениуса)

Для характеров χ_W, χ_U произвольных представлений $G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$ и $H \rightarrow \mathrm{GL}(U)$ конечной группы G и её подгруппы H имеет место равенство скалярных произведений

$$(\chi_{\mathrm{ind} U}, \chi_W)_G = (\chi_U, \chi_{\mathrm{res} W})_H, \quad (4-3)$$

в частности, кратность неприводимого G -модуля W в разложении индуцированного с неприводимого H -модуля U представления группы G равна кратности модуля U в разложении ограничения представления W на подгруппу H :

$$m_U(\mathrm{res} W) = m_W(\mathrm{ind} U). \quad (4-4)$$

Доказательство. Равенство (4-3) получается из (4-2) по сл. 3.8 на стр. 32 сравнением размерностей обеих частей. Соотношение (4-4) вытекает из (4-3) по сл. 3.9 на стр. 32. $\square$

Следствие 4.2

Если группа G имеет абелеву подгруппу $H \subset G$, то размерность любого неприводимого представления группы G не превышает¹ индекса $[G : H]$.

Доказательство. Пусть представление U группы G неприводимо, и L — одномерный H -подмодуль в $\text{res } U$. В силу взаимности Фробениуса $\text{ind } L$ содержит U с ненулевой кратностью, откуда $\dim U \leq \dim \text{ind } L = [G : H]$. $\square$

Предложение 4.3 (транзитивность индуцирования)

Для пары вложенных подгрупп $K \subset H \subset G$ и любого представления $\varrho : K \rightarrow \text{GL}(U)$ имеется канонический изоморфизм G -модулей $\text{ind}_H^G \text{ind}_K^H U \simeq \text{ind}_K^G U$.

Доказательство. Поскольку для любого G -модуля W имеется канонический изоморфизм

$$\text{Hom}_K(U, W) \simeq \text{Hom}_H(\text{ind}_K^H U, W) \simeq \text{Hom}_G(\text{ind}_H^G \text{ind}_K^H U, W), \quad \psi \mapsto \psi \circ \tau_K \circ \tau_H,$$

отображение $\tau_K \circ \tau_H : U \rightarrow \text{ind}_H^G \text{ind}_K^H U$ универсально в смысле предл. 4.1. По упр. 4.4 оно отождествляется с отображением $U \rightarrow \text{ind}_K^G U$ единственным изоморфизмом. $\square$

Упражнение 4.5. Покажите, что ограничение и индуцирование перестановочны с прямыми суммами представлений.

4.2.2. Строение индуцированного представления. Тензорное произведение

$$\mathbb{k}G \otimes U = \bigoplus_{g \in G} (\mathbb{k} \cdot g) \otimes V$$

представляет собою прямую сумму $|G|$ копий пространства V , занумерованных элементами $g \in G$. Факторизация по соотношениям $(gh) \otimes v = g \otimes (hv)$ склеивает между собою все прямые слагаемые, занумерованные элементами из одного смежного класса gH так, что $gh \otimes v$ отождествляется с $g \otimes hv$. В результате тензорное произведение над $\mathbb{k}H$ оказывается изоморфно прямой сумме $r = [G : H]$ копий пространства V занумерованных какой-либо фиксированной системой $\{g_1, \dots, g_r\}$ представителей левых смежных классов подгруппы H

$$\mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V \simeq g_1 V \oplus \dots \oplus g_r V. \quad (4-5)$$

В этом разложении каждое $g_v V$ представляет собой копию пространства V , а стоящий слева значок g_v указывает, что данная копия соответствует смежному классу $g_v H$. Если писать $g_v v$ для обозначения вектора $v \in V$, лежащего в g_v -й копии $g_v V$ пространства V , то каждый вектор $w \in \mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V$ однозначно запишется в виде суммы $\sum_{v=1}^r g_v v_v$, где $v_v \in V$. Левое умножение на элемент $g \in G$ в группе G осуществляет перестановку смежных классов: для каждого $g \in G$ и $v \in \{1, \dots, r\}$ найдутся единственные такие $h = h(g, v) \in H$ и $\mu = \mu(g, v) \in \{1, \dots, r\}$, что $gg_v = g_\mu h$. В этих обозначениях действие элемента $g \in G$ на вектор $g_v v \in g_v V$ происходит по правилу $gg_v v = g_\mu hv \in g_\mu V$, где $hv \in V$ есть результат действия оператора $h \in H$ на вектор $v \in V$ согласно представлению подгруппы H в $\text{GL}(V)$.

¹Ниже, в теор. 4.2 на стр. 45 мы увидим, что если абелева подгруппа H нормальна в G , то размерности всех неприводимых G -модулей делят индекс $[G : H]$.

ПРИМЕР 4.2

Пусть $G = S_3$ и $H \simeq S_2$ — подгруппа, порождённая транспозицией $\sigma = |12\rangle$. В качестве представителей смежных классов G/H выберем e , τ и τ^2 , где $\tau = |123\rangle$. Представление $W = \text{ind } \mathbb{1}$, индуцированное тривиальным одномерным представлением, трёхмерно с базисом e , τ , τ^2 и образующие $\sigma, \tau \in S_3$ действуют на этот базис матрицами

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

соответственно. Тем самым, W изоморфно тавтологическому представлению S_3 и является суммой тривиального одномерного представления и двумерного представления группой треугольника. Представление $W' = \text{ind } \text{sgn}$, индуцированное одномерным знаковым представлением, также трёхмерно с тем же базисом, но σ и τ теперь действуют на него матрицами

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Это представление является прямой суммой знакового представления в одномерном пространстве, натянутом на $e + \tau + \tau^2$ и треугольного представления в ортогональной плоскости. Представление, индуцированное с двумерного левого регулярного представления $\mathbb{k}[S_2]$, это 6-мерное левое регулярное представление группы S_3 в $\mathbb{k}[S_3] = e \cdot \mathbb{k}[S_2] \oplus \tau \cdot \mathbb{k}[S_2] \oplus \tau^2 \cdot \mathbb{k}[S_2]$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.6. Убедитесь, что регулярное представление любой подгруппы всегда индуцирует регулярное представление объемлющей группы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.4 (ХАРАКТЕР ИНДУЦИРОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)

Пусть пересечение класса сопряжённых элементов $C \subset G$ с подгруппой $H \subset G$ раскладывается в объединение $C \cap H = D_1 \sqcup \dots \sqcup D_m$ различных классов H -сопряжённости. Тогда для любого представления V подгруппы H характер индуцированного им представления принимает на классе C значение $\chi_{\text{ind } V}(C) = [G : H] \cdot \sum_{i=1}^m \chi_V(D_i) \cdot |D_i| / |C|$. В частности, для тривиального одномерного представления $V = \mathbb{1}$ имеем

$$\chi_{\text{ind } \mathbb{1}}(C) = [G : H] \cdot |C \cap H| / |C|. \quad (4-6)$$

Доказательство. Поскольку элемент $g \in C$ переставляет слагаемые $g_v V$ разложения (4-5), след его действия равен сумме следов действий на тех слагаемых $g_v V$, которые остаются при этой перестановке на месте, что означает равенство $g g_v = g_v h$ для некоторого $h = g_v^{-1} g g_v \in H$. При этом действие элемента g на таком слагаемом $g_v V$ совпадает с действием элемента h на пространстве V , и его след равен $\chi_V(h) = \chi_V(g_v^{-1} g g_v)$. Поэтому

$$\chi_{\text{ind } V}(g) = \sum_{\substack{v: \\ g_v^{-1} g g_v \in H}} \chi_V(g_v^{-1} g g_v) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G: \\ s^{-1} g s \in H}} \chi_V(s^{-1} g s) = \frac{1}{|H|} \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{s \in G: \\ s^{-1} g s \in D_i}} \chi_V(D_i),$$

где во втором равенстве мы заменили каждое слагаемое левой суммы на $|H|$ равных друг другу слагаемых, получающихся заменой элемента g_v на всевозможные $s \in g_v H$, а в третьем —

собрали вместе все слагаемые, у которых $s^{-1}gs$ лежит в одном классе H -сопряжённости D_i . Поскольку различных произведений $s^{-1}gs \in D_i$ имеется $|D_i|$ штук, и по формуле для длины орбиты каждое из них получается из $|G|/|C|$ различных $s \in G$, мы заключаем, что $\chi_{\text{ind } V}(g) = |H|^{-1} \sum_{i=1}^m \chi_V(D_i) \cdot |D_i| \cdot |G|/|C|$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.7 (ФОРМУЛА ПРОЕКЦИИ). Убедитесь, что для любых G -модуля W и H -модуля V имеется канонический изоморфизм G -модулей¹ $\text{ind}((\text{res } W) \otimes V) \simeq W \otimes \text{ind } V$.

4.3. Коиндуцированные модули. В теории представлений ассоциативных алгебр имеется ещё один способ сопоставить A -модулю V модуль над алгеброй B , содержащей A в качестве подалгебры, а именно — коиндуцированный модуль $\text{coind } V \stackrel{\text{def}}{=} \text{Hom}_A(B, V)$, на котором имеется левое действие алгебры B правым умножением аргументов:

$$b : \psi \mapsto b\psi, \text{ где } b\psi(b') = \psi(b'b).$$

УПРАЖНЕНИЕ 4.8. Проверьте равенство $(b_1 b_2) \psi = b_1 (b_2 \psi)$.

Коиндуцированный модуль обладает двойственным к описанному в [предл. 4.1](#) на стр. 37 универсальным свойством: каноническое отображение $\tau^A : \text{Hom}_A(B, V) \rightarrow V$, $\varphi \mapsto \varphi(1)$, является гомоморфизмом A -модулей, и для любого перестановочного с действием A гомоморфизма $\varphi : W \rightarrow V$ в произвольный B -модуль W существует единственный такой гомоморфизм B -модулей $\psi : W \rightarrow \text{Hom}_A(B, V)$, что $\tau^A \circ \psi = \varphi$, т. е. для всех A -модулей V и B -модулей W имеется канонический изоморфизм

$$\text{Hom}_B(W, \text{coind } V) \simeq \text{Hom}_A(\text{res } W, V), \quad \psi \mapsto \tau^A \circ \psi, \quad (4-7)$$

сопоставляющий гомоморфизму B -модулей $\psi : W \rightarrow \text{Hom}_A(B, V)$, $w \mapsto \psi_w$, гомоморфизм A -модулей

$$\tau^A \circ \psi : W \rightarrow V, \quad w \mapsto \psi_w(1).$$

Обратное отображение переводит гомоморфизм A -модулей $\varphi : W \rightarrow V$ в гомоморфизм B -модулей

$$\psi : W \rightarrow \text{Hom}_A(B, V), \quad w \mapsto \psi_w, \text{ где } \psi_w : B \rightarrow V, \quad b \mapsto \varphi(bw).$$

УПРАЖНЕНИЕ 4.9. Убедитесь, что оба отображения корректно определены и взаимно обратны. В ситуации, когда $A = \mathbb{k}H$, $B = \mathbb{k}G$ суть групповые алгебры конечной группы G и её подгруппы $H \subset G$, преобразование Фурье² индуцирует изоморфизм векторных пространств

$$\Phi \otimes_{\mathbb{k}} \text{Id}_V : \text{Hom}(\mathbb{k}G, V) \simeq \mathbb{k}G^* \otimes_{\mathbb{k}} V \simeq \mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}} V,$$

который переводит разложимый оператор $\varphi = \xi \otimes_{\mathbb{k}} v : g \mapsto \xi(g)v$ ранга 1 в оператор

$$\hat{\xi} \otimes_{\mathbb{k}} v = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \xi(g^{-1})g \otimes_{\mathbb{k}} v = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \otimes_{\mathbb{k}} (\xi(g^{-1})v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \otimes_{\mathbb{k}} \varphi(g^{-1})$$

и, стало быть, действует на произвольный линейный оператор $\varphi : \mathbb{k}G \rightarrow V$ по правилу

$$\varphi \mapsto \hat{\varphi} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \otimes_{\mathbb{k}} \varphi(g).$$

¹Тензорные произведения в левой и правой частях суть описанные в [п° 2.1](#) на стр. 13 тензорные произведения представлений групп H и G соответственно.

²См. форм. (3-25) на стр. 31.

Оператор $\widehat{\varphi}$ называется *преобразованием Фурье* оператора φ . Преобразование Фурье перестановочно с левым действием G , ибо для всех $s \in G$

$$\widehat{s\varphi} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \otimes s\varphi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \otimes \varphi(gs) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} sg^{-1} \otimes \varphi(g) = s\widehat{\varphi},$$

а его композиция с проекцией $\mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}} V \twoheadrightarrow \mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V$ устанавливает изоморфизм подпространства $\text{Hom}_H(\mathbb{k}G, V) \subset \text{Hom}(\mathbb{k}G, V)$ с индуцированным G -модулем $\text{ind } V = \mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.10. Докажите последнее утверждение.

Таким образом, индуцированное и коиндуцированное представления конечной группы канонически изоморфны друг другу посредством преобразования Фурье.

4.4. Целые элементы в расширениях колец. Покажем, что следующие три свойства элемента $b \in B$ в расширении коммутативных колец $A \subset B$ с общей единицей эквивалентны друг другу:

- (1) b является корнем приведённого многочлена из $A[x]$
- (2) A -линейная оболочка всех целых неотрицательных степеней b^m линейно порождается над A конечным числом элементов
- (3) существует такой конечно порождённый A -подмодуль $M \subset B$, что $bM \subset M$ и M не аннулируется умножением ни на какой ненулевой элемент¹ из B .

Элементы $b \in B$, обладающие этими свойствами, называются *целыми* над A .

В самом деле, свойство (1) равносильно тому, что некоторая степень элемента b линейно выражается через меньшие степени с коэффициентами из A , т. е.

$$b^m = a_1 b^{m-1} + \dots + a_{m-1} b + a_m$$

для некоторых $m \in \mathbb{N}$ и $a_1, \dots, a_m \in A$, откуда сразу следует свойство (2). Если выполнено свойство (2), то A -линейная оболочка всех целых неотрицательных степеней элемента b удовлетворяет свойству (3), поскольку конечно порождена и содержит единицу $b^0 = 1$. Ну а если выполняется свойство (3), и элементы $e_1, \dots, e_m \in M$ линейно порождают M над A , то A -линейный оператор умножения на b : $M \rightarrow M$, $t \mapsto bt$, действует на эти образующие по правилу

$$(be_1, be_2, \dots, be_m) = (e_1, \dots, e_m) \cdot Y, \quad (4.8)$$

где $Y \in \text{Mat}_m(A)$ — квадратная матрица с элементами из A . Из тождества $\det X \cdot E = X \cdot X^\vee$, где X — произвольная квадратная матрица, E — единичная матрица того же размера, а $X^\vee$ — присоединённая к X матрица², вытекает, что образ оператора умножения на $\det X$ содержится в линейной оболочке столбцов матрицы X . Поэтому модуль $\det(bE - Y)M$ содержится в линейной оболочке векторов $(e_1, \dots, e_m) \cdot (bE - Y)$, нулевой в силу соотношения (4.8). Из равенства $\det(bE - Y)M = 0$ и B -точности модуля M вытекает, что $\det(bE - Y) = 0$. Так как все элементы матрицы Y лежат в A , её характеристический многочлен $\chi_Y(x) = \det(xE - Y)$ лежит в $A[x]$. Он приведён, и b является его корнем.

¹Такие модули называются *B-точными* (по-английски *faithful*).

²Т. е. транспонированная к матрице алгебраических дополнений элементов матрицы X , см. раздел 8.4 на с. 138 лекций [Алг 1].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1 (целое замыкание)

Множество всех целых над A элементов кольца $B \supset A$ называется *целым замыканием* подкольца A в B . Если оно совпадает с A , кольцо A называется *целозамкнутым* в B . Если оно совпадает с B , кольцо B называется *целым расширением* кольца A или *целой A -алгеброй*.

ПРИМЕР 4.3 (целозамкнутость факториального кольца в поле частных)

Покажем, что каждое факториальное¹ кольцо A целозамкнуто в своём поле частных² $Q_A \supset A$. Если многочлен $a_0 t^m + \dots + a_{m-1} t + a_m \in A[t]$ аннулирует дробь $p/q \in Q_A$ с $\text{нод}(p, q) = 1$, то $a_0 p^m + a_1 q p^{m-1} + \dots + a_{m-1} q^{m-1} p + a_m q^m = 0$, откуда $q \mid a_0$, и если $a_0 = 1$, то q обратим, и $p/q \in A$. В частности, кольцо $\mathbb{Z}$ целозамкнуто в поле $\mathbb{Q}$, а кольцо $\mathbb{k}[x]$, где $\mathbb{k}$ — любое поле, целозамкнуто в поле $\mathbb{k}(x)$.

ПРИМЕР 4.4 (инварианты действия конечной группы)

Если конечная группа G действует на кольце B кольцевыми автоморфизмами, то B цело над подкольцом инвариантов $B^G \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in B \mid ga = a \ \forall g \in G\}$, поскольку каждый элемент $b \in B$ является корнем приведённого многочлена $B(t) = \prod_{\beta \in Gb} (t - \beta)$, где произведение берётся по всем различным элементам β из G -орбиты Gb элемента b , и коэффициенты этого многочлена, будучи симметрическими многочленами от элементов G -орбиты, G -инвариантны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.5

Целое замыкание любого подкольца $A \subset B$ является подкольцом в B . В любом расширении колец $C \supset B$ всякий элемент $c \in C$, целый над целым замыканием A в B , цел и над A .

Доказательство. Если элементы $p, q \in B$ таковы, что

$$p^m = x_1 p^{m-1} + \dots + x_{m-1} p + x_m \quad \text{и} \quad q^n = y_1 q^{n-1} + \dots + y_{n-1} q + y_n$$

для некоторых $x_i, y_i \in A$, то произведения $p^i q^j$ с $0 \leq i \leq m-1$ и $0 \leq j \leq n-1$ порождают A -модуль, который выдерживает умножение и на p , и на q , а значит, и на $p+q$, и на pq . Поскольку он содержит единицу, его нельзя аннулировать умножением ни на какой элемент из B . Аналогично, если $z_0^r = z_1 z_0^{r-1} + \dots + z_{r-1} z_0 + z_r$, где каждый z_k с $k > 0$ удовлетворяет равенству

$$z_k^{m_k} = a_{k,1} z_k^{m_k-1} + \dots + a_{k,m_k-1} z_k + a_{k,m_k}$$

для некоторых $a_{k,\ell} \in A$, то умножение на элемент z_0 переводит в себя A -линейную оболочку всех произведений $z_0^{j_0} z_1^{j_1} \dots z_r^{j_r}$, где $0 \leq j_0 \leq r-1$ и $0 \leq j_k \leq m_k-1$ при $k > 0$. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 4.3 (лемма Гаусса–Кронекера–Дедекинда)

Для любого расширения колец $A \subset B$ и произвольных приведённых многочленов $f, g \in B[x]$ положительной степени все коэффициенты произведения $f(x)g(x)$ целы над A , если и только если все коэффициенты обоих многочленов $f(x)$ и $g(x)$ целы над A .

Доказательство. Если коэффициенты многочленов f и g целы над A , то коэффициенты их произведения $h = fg$ тоже целы над A , поскольку целые элементы образуют кольцо. Чтобы показать обратное, рассмотрим какое-нибудь кольцо $C \supset B$, над которым f и g полностью разлага-

¹См. раздел 4.4 на с. 74 лекций [Алг 1].

²См. раздел 3.1 на с. 55 лекций [Алг 1].

ются на линейные множители¹, т. е. $f(x) = \prod (x - \alpha_\nu)$ и $g(x) = \prod (x - \beta_\mu)$ в $C[x]$ для некоторых $\alpha_\nu, \beta_\mu \in C$. Если все коэффициенты многочлена $h(x) = \prod (x - \alpha_\nu) \prod (x - \beta_\mu)$ целы над A , то все его корни α_ν и β_μ целы над целым замыканием A в C , а значит, и над самим A . Поскольку коэффициенты многочленов f и g являются многочленами от α_ν и β_μ , они тоже целы над A . $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.11. Пусть кольцо B цело над подкольцом $A \subset B$. Покажите, что если B — поле, то и A поле, и наоборот, если A — поле, и в B нет делителей нуля, то B — поле.

ПРИМЕР 4.5 (ЦЕЛЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЧИСЛА)

Пусть поле $\mathbb{K} \supset \mathbb{Q}$ конечномерно как векторное пространство над $\mathbb{Q}$. Элементы таких полей называются *алгебраическими числами*. По [предл. 4.5](#) целые над $\mathbb{Z}$ алгебраические числа образуют в поле $\mathbb{K}$ подкольцо. Оно называется *кольцом целых* поля $\mathbb{K}$ и обозначается $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$. Если число $\vartheta \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ является корнем приведённого многочлена $f \in \mathbb{Z}[x]$, то f делится в $\mathbb{Q}[x]$ на минимальный многочлен² $\mu_\vartheta \in \mathbb{Q}[x]$ числа ϑ над $\mathbb{Q}$. По [сл. 4.3](#) коэффициенты многочлена μ_ϑ целы над $\mathbb{Z}$, а поскольку $\mathbb{Z}$ цело замкнуто в $\mathbb{Q}$, они лежат в $\mathbb{Z}$. Мы заключаем, что минимальный над полем $\mathbb{Q}$ многочлен целого алгебраического числа имеет целые коэффициенты. Характеристический многочлен³ $\chi_\vartheta \in \mathbb{Q}[x]$ оператора умножения $\vartheta: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \vartheta x$, на алгебраическое число $\vartheta \in \mathbb{K}$ имеет в поле $\mathbb{C}$ те же корни, что и минимальный многочлен⁴ μ_ϑ . Если $\vartheta \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$, то $\mu_\vartheta \in \mathbb{Z}[x]$, и стало быть, все эти корни целы над $\mathbb{Z}$. Поэтому все коэффициенты характеристического многочлена целого алгебраического числа целы над $\mathbb{Z}$ и, будучи рациональными числами, лежат в $\mathbb{Z}$. В частности определитель $\det \vartheta$ и след $\text{tr } \vartheta$ оператора умножения на целое алгебраическое число $\vartheta \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ лежат в $\mathbb{Z}$. Они называются *нормой* и *следом* алгебраического числа ϑ и обозначаются $N(\vartheta) \stackrel{\text{def}}{=} \det \vartheta$ и $\text{Sp}(\vartheta) \stackrel{\text{def}}{=} \text{tr } \vartheta$. Отметим, что $N(\vartheta_1 \vartheta_2) = N(\vartheta_1)N(\vartheta_2)$, и $\text{Sp}(\vartheta_1 + \vartheta_2) = \text{Sp}(\vartheta_1) + \text{Sp}(\vartheta_2)$.

Поскольку целые неотрицательные степени ξ^m любого числа $\xi \in \mathbb{K}$ линейно зависимы над $\mathbb{Q}$, каждое алгебраическое число ξ удовлетворяет уравнению $a_0 \xi^n + \dots + a_{n-1} \xi + a_n = 0$ с коэффициентами $a_i \in \mathbb{Z}$ и $n = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{K}$. Так как число $\zeta = a_0 \xi$ удовлетворяет уравнению

$$\zeta^n + a_1 \zeta^{n-1} + a_0 a_2 \zeta^{n-2} + \dots + a_0^{n-1} a_n = 0,$$

оно цело над $\mathbb{Z}$, т. е. подходящее целое кратное любого алгебраического числа цело над $\mathbb{Z}$. Мы заключаем, что каждое конечномерное над $\mathbb{Q}$ поле $\mathbb{K} \supset \mathbb{Q}$ является полем частных своего кольца целых $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$, и для любого базиса $e_1, \dots, e_d$ поля $\mathbb{K}$ как векторного пространства над $\mathbb{Q}$ существует такое $m \in \mathbb{N}$, что все $me_i \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$. Таким образом, поле $\mathbb{K}$ имеет над $\mathbb{Q}$ базис из целых алгебраических чисел. Целые алгебраические числа образуют модуль над кольцом $\mathbb{Z}$. Покажем, что он изоморфен $\mathbb{Z}^n$, где $n = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{K}$. Для этого рассмотрим *билинейную форму следа* $\text{sp}: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{Q}$, значение которой на элементах $\xi, \vartheta \in \mathbb{K}$ равно следу $\text{tr}(\xi \vartheta)$ оператора умножения на $\xi \vartheta$:

$$\xi \vartheta: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \xi \vartheta x.$$

¹ Кольцо $C \supset B$, над которым заданный приведённый многочлен $f \in B[x]$ полностью раскладывается на линейные множители, строится индукцией по $\deg f$, как в доказательстве теоремы 1 на с. 46 лекций [\[Алг1\]](#). Если $\deg f > 0$, то B вкладывается в фактор кольцо $F = B[x]/(f)$ как подкольцо, образованное классами констант. В кольце F многочлен f имеет корень $\gamma = x \pmod{f}$. Поэтому $f(x) = (x - \gamma) \cdot f_1(x)$, где $f_1 \in F[x]$ тоже приведён и $\deg f_1 < \deg f$. По индукции, $f_1 = \prod (x - \gamma_i)$ для подходящих элементов γ_i из подходящего расширения $C \supset F \supset B$.

² Т. е. приведённый многочлен наименьшей степени с коэффициентами в $\mathbb{Q}$, зануляющийся на элементе ϑ , см. раздел 5.7.2 на с. 72 лекций [\[Гео1\]](#).

³ См. раздел 9.1.4 на с. 146 лекций [\[Алг1\]](#).

⁴ См. разделы 9.1.4-9.1.5 на с. 146-147 лекций [\[Алг1\]](#).

УПРАЖНЕНИЕ 4.12. Убедитесь, что форма sp симметрична и невырождена¹.

Пусть целые элементы $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ образуют базис поля $\mathbb{K}$ над $\mathbb{Q}$, а $e_1^{\times}, \dots, e_n^{\times} \in \mathbb{K}$ — двойственный к нему базис относительно формы следа². Произвольный элемент $\vartheta \in \mathbb{K}$ раскладывается по второму базису как³ $\vartheta = \sum_{i=1}^n \text{sp}(e_i, \vartheta) e_i^{\times}$. Так как $e_i \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ и для любого $\vartheta \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ след произведения $\vartheta e_i \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ лежит в $\mathbb{Z}$, мы заключаем, что $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ содержится в свободном $\mathbb{Z}$ -модуле с базисом $e_1^{\times}, \dots, e_n^{\times}$. Поэтому $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ тоже является сводным модулем ранга не выше⁴ n . А так как векторы $e_1, \dots, e_n \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ линейно независимы над $\mathbb{Q}$, а значит, и над $\mathbb{Z}$, $\text{rang}_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_{\mathbb{K}} = n$.

Обратите внимание, что всякий базис модуля $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ над $\mathbb{Z}$ одновременно является базисом векторного пространства $\mathbb{K}$ над $\mathbb{Q}$, и умножение на любой элемент $\vartheta \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ записывается в этом базисе целочисленной матрицей. Именно так целые алгебраические числа и были впервые определены Дедекиндом в XIX веке: как числа $\vartheta \in \mathbb{K}$, умножение на которые записывается целочисленной матрицей в подходящем базисе поля $\mathbb{K}$ над $\mathbb{Q}$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.13. Опишите кольца целых чисел в полях

а) $\mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 5)$ б) $\mathbb{Q}[i] = \mathbb{Q}[x]/(x^2 + 1)$ в) $\mathbb{Q}[\omega] = \mathbb{Q}[x]/(x^2 + x + 1)$.

4.5. Целость характеров комплексных представлений. Пусть G — конечная группа. Значение характера χ_{ϱ} любого комплексного конечномерного представления ϱ группы G на любом элементе $g \in G$ цело над $\mathbb{Z}$ в силу того, что оператор $\varrho(g)$ аннулируется многочленом $t^{|G|} - 1$, все корни которого целы над $\mathbb{Z}$, а значение $\chi_{\varrho}(g)$ равно сумме некоторых из этих корней⁵.

ТЕОРЕМА 4.2

Размерности всех комплексных неприводимых конечномерных линейных представлений конечной группы G делят индекс $[G : A]$ любой её нормальной абелевой подгруппы⁶ $A \triangleleft G$.

Доказательство. Пусть $\varrho : \mathbb{C}G \rightarrow \text{End } W$ — неприводимое комплексное представление. Сначала докажем теорему для единичной подгруппы $A = \{e\}$, т. е. покажем, что $\dim W$ делит $|G|$. В силу [прим. 4.3](#) достаточно убедиться, что рациональное число $|G| / \dim W$ цело над $\mathbb{Z}$. Так как представление ϱ неприводимо, скалярный квадрат его характера равен единице:

$$1 = (\chi_{\varrho}, \chi_{\varrho}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr } \varrho(g^{-1}) \cdot \text{tr } \varrho(g). \quad (4-9)$$

Функция $g \mapsto \text{tr } \varrho(g^{-1})$ постоянна на классах сопряжённости, и её значения целы над $\mathbb{Z}$. Обозначим через $\tau(K) \in \mathbb{C}$ её значение на классе $K \in \text{Cl}(G)$ и перепишем (4-9) как

$$\frac{|G|}{\dim W} = \frac{1}{\dim W} \sum_{g \in G} \text{tr } \varrho(g^{-1}) \cdot \text{tr } \varrho(g) = \sum_{K \in \text{Cl}(G)} \frac{\tau(K)}{\dim W} \text{tr } \sum_{g \in K} \varrho(g).$$

¹См. раздел 13.2 на с. 173 лекций [\[Гео 1\]](#).

²Это означает, что $\text{sp}(e_i, e_j^{\times}) = \delta_{ij}$, см. раздел 13.2.1 на с. 175 лекций [\[Гео 1\]](#).

³Ср. с формулой 13.2 на с. 175 лекций [\[Гео 1\]](#).

⁴См. теорему 6.2 на с. 111 лекций [\[Алг 1\]](#).

⁵Напомним, что собственные числа оператора содержатся среди корней любого аннулирующего этот оператор многочлена, см. раздел 9.1.5 на с. 147 лекций [\[Алг 1\]](#).

⁶Включая единичную подгруппу $\{e\}$ — в этом случае теорема тоже содержательна.

Достаточно проверить, что каждое из чисел

$$\frac{1}{\dim W} \operatorname{tr} \sum_{g \in K} \varrho(g) = \frac{\operatorname{tr} \varrho(g_K)}{\dim W}, \quad \text{где } g_K \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{g \in K} g \in Z_{\mathbb{Z}G},$$

цело над $\mathbb{Z}$. Неприводимое представление ϱ переводит конечно порождённый $\mathbb{Z}$ -модуль центральных элементов подкольца $\mathbb{Z}G \subset \mathbb{C}G$ в конечно порождённый $\mathbb{Z}$ -подмодуль кольца $\operatorname{End} W$. По лемме Шура все элементы последнего подмодуля являются скалярными гомотетиями, ибо перестановочны со всеми элементами группы. Коэффициенты этих гомотетий образуют конечно порождённый $\mathbb{Z}$ -подмодуль в $\mathbb{C}$, выдерживающий умножение на каждый из коэффициентов. Следовательно, все эти коэффициенты целы над $\mathbb{Z}$. Но коэффициент гомотетии $\varrho(g_K)$ как раз и равен $\operatorname{tr} \varrho(g_K) / \dim W$. Итак, $|G| / \dim W \in \mathbb{Z}$.

Теперь рассмотрим случай, когда $A = Z_G$ является центром группы G , т. е. покажем, что рациональное число $q = [G : Z_G] / \dim W$ тоже цело над $\mathbb{Z}$. Для этого достаточно убедиться, что все его натуральные степени q^n лежат в конечно порождённом $\mathbb{Z}$ -подмодуле поля $\mathbb{Q}$. Рассмотрим действие группы $G^n = G \times \dots \times G$ на $W^{\otimes n}$ по правилу

$$(g_1, \dots, g_n) : w_1 \otimes \dots \otimes w_n \mapsto \varrho(g_1)w_1 \otimes \dots \otimes \varrho(g_n)w_n.$$

По теор. 4.1 на стр. 35 это внешнее тензорное произведение одинаковых неприводимых представлений группы G неприводимо. Подгруппа $C \subset G^n$, состоящая из таких элементов $(c_1, \dots, c_n)$, что все $c_i \in Z_G$ и произведение $c_1 \dots c_n = 1$, содержится в ядре этого представления, поскольку по лемме Шура каждый центральный элемент c_i действует в неприводимом представлении ϱ умножением на некоторую константу, и произведение этих констант равно единице в силу равенства $\prod \varrho(c_i) = \varrho(c_1 \dots c_n) = \varrho(1) = 1$. Подгруппа C имеет порядок $|Z_G|^{n-1}$ и нормальна, поскольку лежит в центре группы G^n . Таким образом, пространство $W^{\otimes n}$ размерности $\dim^n W$ является неприводимым представлением фактор группы G^n / C порядка $|G|^n / |Z_G|^{n-1}$. По уже доказанному

$$\frac{|G|^n}{(\dim W)^n |Z_G|^{n-1}} = |Z_G| \cdot q^n \in \mathbb{Z}.$$

Тем самым, все степени q^n лежат в $\mathbb{Z}$ -модуле $|Z_G|^{-1} \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ ранга 1.

Наконец, рассмотрим произвольную нормальную абелеву подгруппу $A \triangleleft G$ и изотипное разложение $\operatorname{res}_A W = \bigoplus W_\chi$ ограничения представления ϱ на A . Каждая изотипная компонента W_χ является прямой суммой одномерных представлений абелевой группы A , отвечающих некоторому мультипликативному характеру¹ $\chi : A \rightarrow \mathbb{C}^*$, т. е. $aw = \chi(a)w$ для всех $a \in A$ и $w \in W_\chi$. Поскольку подгруппа A нормальна в G , группа G действует на её мультипликативных характерах: элемент $g \in G$ переводит характер $\chi : A \rightarrow \mathbb{C}^*$ в композицию $\chi^g = \chi \circ \operatorname{Ad}_{g^{-1}}$, принимающую на элементах $a \in A$ значения $\chi^g(a) = \chi(g^{-1}ag)$. Так как для всех $w \in W_\chi$, $a \in A$, $g \in G$

$$agw = gg^{-1}agw = g\chi^g(a)w = \chi^g(a)gw,$$

в представлении ϱ каждый элемент $g \in G$ изоморфно отображает изотипную компоненту W_χ на компоненту W_{χ^g} . Поскольку представление ϱ неприводимо, действие G на изотипных компонентах W_χ транзитивно. Поэтому все компоненты имеют одну и ту же размерность, и она делит $\dim W$. Если компонента ровно одна, все элементы подгруппы A действуют на W скалярно, и образ $\varrho(A)$ лежит в центре $Z_{\varrho(G)}$ образа всего представления. По уже доказанному индекс

¹См. п. 2.4 на стр. 20.

центра $[\varrho(G) : Z_{\varrho(G)}]$ делится на $\dim W$. Но этот индекс делит индекс $[\varrho(G) : \varrho(A)]$ центральной подгруппы $\varrho(A)$, а последний в свою очередь делит индекс¹ $[G : A]$. Остаётся рассмотреть случай, когда изотипных компонент несколько. Пусть W_χ — одна из них. Обозначим через $H = \{g \in G \mid g(W_\chi) = W_\chi\}$ её стабилизатор в G . Тогда общее число изотипных компонент равно $[G : H]$, подгруппа $H \subsetneq G$ является собственной, содержит A , и её линейное представление в пространстве W_χ неприводимо.

Упражнение 4.14. Убедитесь в этом.

Применяя индукцию по порядку $|G|$, мы можем считать, что $\dim W_\chi$ делит индекс $[H : A]$. Но тогда и $\dim W = [G : H] \cdot \dim W_\chi$ делит $[G : A] = [G : H] \cdot [H : A]$. $\square$

¹Ибо гомоморфизм ϱ корректно задаёт эпиморфизм фактор групп $G/A \rightarrow \varrho(G)/\varrho(A)$.

Ответы и указания к некоторым упражнениям

Упр. 4.1. Это аналогично доказательству соотношения 3-20 из лем. 3.2 на стр. 30.

Упр. 4.3. По универсальному свойству тензорного произведения $\mathbb{Z}$ -модулей $\mathbb{Z}$ -билинейное отображение аддитивных абелевых групп $A \times B \rightarrow C$, $(a, b) \mapsto \alpha(a) \cdot \beta(b)$, единственным образом понимается до $\mathbb{Z}$ -линейного отображения $A \otimes B \rightarrow C$, $a \otimes b \mapsto \alpha(a) \cdot \beta(b)$, которое автоматически является гомоморфизмом колец. Утверждение о том, что тензорное произведение колец однозначно задаётся своим универсальным свойством, доказывается стандартно,¹.

Упр. 4.6. Каноническое отображение B -модулей $B \otimes_A A \rightarrow B$, ассоциированное с вложением A -модулей $A \hookrightarrow B$, является изоморфизмом для любого расширения $A \subset B$ ассоциативных алгебр с единицами.

Упр. 4.10. Зафиксируем систему представителей $\{g_1, \dots, g_r\}$ смежных классов G/H . Тогда $G = g_1 H \sqcup \dots \sqcup g_r H = H g_1^{-1} \sqcup \dots \sqcup H g_r^{-1}$, и каждый H -инвариантный оператор $\varphi: \mathbb{k}G \rightarrow V$ однозначно задаётся указанием s векторов $v_\nu = \varphi(g_\nu^{-1}) \in V$ ибо действует на остальные базисные векторы по правилу $\varphi(h g_\nu^{-1}) = h v_\nu$. Поэтому

$$\dim \operatorname{Hom}_H(\mathbb{k}G, V) = [G : H] \cdot \dim V = \dim \mathbb{k}G \otimes_{\mathbb{k}H} V.$$

Преобразование Фурье от H -инвариантного оператора $\varphi: g_\nu^{-1} \mapsto v_\nu$ равно

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \otimes_{\mathbb{k}H} \varphi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\nu} \sum_{h \in H} g_\nu h^{-1} \otimes_{\mathbb{k}H} \varphi(h g_\nu^{-1}) = \frac{|H|}{|G|} \sum_{\nu} g_\nu v_\nu \in \bigoplus_{\nu} g_\nu V$$

и зануляется только когда все $v_\nu = 0$.

Упр. 4.11. Если B — поле, целое над A , то обратный к произвольному ненулевому $a \in A$ элемент $a^{-1} \in B$ удовлетворяет уравнению $a^{-m} = \alpha_1 a^{1-m} + \dots + \alpha_{m-1} a^{-1} + \alpha_0$, где $\alpha_\nu \in A$. Умножая обе части на a^{m-1} , заключаем, что $a^{-1} = \alpha_1 + \dots + \alpha_{m-1} a^{m-2} + \alpha_0 a^{m-1} \in A$. Обратно, если A — поле, и B — целая A -алгебра, то все неотрицательные целые степени b^i любого ненулевого элемента $b \in B$ порождают конечномерное векторное пространство V над полем A . Если в B нет делителей нуля, то линейный оператор $b: V \rightarrow V$, $x \mapsto bx$, сюръективен, так как имеет нулевое ядро. Обратный к b элемент b^{-1} является прообразом единицы $1 \in V$.

Упр. 4.12. Первое очевидно, второе вытекает из того, что $\operatorname{sp}(\vartheta, \vartheta^{-1}) = \operatorname{tr}(1) = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{K}$ для любого $\vartheta \neq 0$.

¹Ср. с с доказательством предложения 13.2 на с. 212 лекций [Алг 1].