

## §5. Представления симметрических групп.

**5.1. Действие  $S_n$  на заполненных диаграммах Юнга.** Будем называть заполнение клеток диаграммы Юнга  $\lambda$  не повторяющимися числами от 1 до  $n = |\lambda|$  (стандартным) заполнением формы  $\lambda$  и веса  $n = |\lambda|$ . С каждым таким заполнением  $T$  связаны строчная подгруппа  $R_T \subset S_n$ , состоящая из всех перестановок чисел  $1, \dots, n$ , переводящих элементы каждой строки заполнения  $T$  в элементы из той же самой строки, и столбцовая подгруппа  $C_T \subset S_n$ , состоящая из всех перестановок, переводящих элементы каждого столбца заполнения  $T$  в элементы из того же самого столбца. Таким образом,  $R_T \simeq S_{\lambda_1} \times \dots \times S_{\lambda_k}$  и  $C_T \simeq S_{\lambda_1^t} \times \dots \times S_{\lambda_m^t}$ , где  $\lambda^t = (\lambda_1^t, \dots, \lambda_m^t)$  здесь и далее означает транспонированную к  $\lambda$  диаграмму.

УПРАЖНЕНИЕ 5.1. Убедитесь, что  $S_n$  транзитивно действует на стандартных заполнениях фиксированной формы  $\lambda$  и что  $R_{gT} = gR_Tg^{-1}$  и  $C_{gT} = gC_Tg^{-1}$  для всех  $g \in S_n$ .

Мы пишем  $\lambda \geq \mu$  и говорим, что диаграмма  $\lambda$  доминирует диаграмму  $\mu$ , если

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_k \geq \mu_1 + \dots + \mu_k \text{ при всех } k \in \mathbb{N}.$$

Мы пишем  $\lambda > \mu$ , если  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$  лексикографически больше, чем  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_m)$ . Отметим, что диаграмма  $\mu$  не может доминировать никакую диаграмму  $\lambda > \mu$ , и что лексикографический порядок является линейным, а доминирование при  $n \geq 6$  задаёт на множестве  $n$ -клеточных диаграмм только частичный порядок.

УПРАЖНЕНИЕ 5.2. Приведите пример двух несравнимых по отношению доминирования диаграмм Юнга.

ЛЕММА 5.1 (КЛЮЧЕВАЯ КОМБИНАТОРНАЯ ЛЕММА)

Пусть стандартное заполнение  $T$  формы  $\lambda$  и стандартное заполнение  $U$  формы  $\mu$  имеют одинаковый вес  $|\lambda| = |\mu|$ , и диаграмма  $\mu$  не является строго доминирующей диаграмму  $\lambda$ . Тогда имеет место ровно одна из двух взаимоисключающих возможностей:

- либо найдутся два числа, стоящие в одной строке заполнения  $T$  и в одном столбце заполнения  $U$
- либо  $\lambda = \mu$  и  $pT = qU$  для некоторых  $p \in R_T$  и  $q \in C_U$ .

Доказательство. Пусть все элементы каждой из строк заполнения  $T$  находятся в разных столбцах заполнения  $U$ . Из того, что все элементы первой строки  $T$  лежат в разных столбцах  $U$ , вытекает неравенство  $\lambda_1 \leq \mu_1$  и существование перестановки  $q_1 \in C_U$ , переводящей все элементы из первой строки заполнения  $T$  в первую строку заполнения  $q_1U$ . Из того, что все элементы второй строки  $T$  тоже лежат в разных столбцах  $U$ , вытекает существование такой не затрагивающей элементов из первой строки заполнения  $T$  перестановки  $q_2 \in C_{q_1U} = C_U$ , что в заполнении  $q_2q_1U$  каждый элемент второй строки заполнения  $T$  стоит либо во второй строке, либо в первой<sup>1</sup>, что влечёт неравенство  $\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2$ . Продолжая в том же духе, мы получим последовательность перестановок  $q_1, \dots, q_k \in C_U$ , где  $k$  — количество строк в диаграмме  $\mu$ , в которой при каждом  $i$  перестановка  $q_i \in C_{q_{i-1}\dots q_1U} = C_U$  оставляет на месте все элементы из первых  $i - 1$  строк заполнения  $T$ , а все элементы из  $i$ -той строки заполнения  $T$  переводит внутрь  $i$  верхних строк заполнения  $q_iq_{i-1}\dots q_1U$ . В частности, при каждом  $i$  будет выполнено

<sup>1</sup>Последнее происходит, когда этот элемент изначально находится в столбце высоты 1.

неравенство  $\lambda_1 + \dots + \lambda_i \leq \mu_1 + \dots + \mu_i$ , что по условию леммы возможно только при  $\lambda = \mu$ . Но тогда каждая перестановка  $q_i$  переводит элементы  $i$ -той строки заполнения  $T$  в точности в  $i$ -тую строку заполнения  $q_i \dots q_1 U$ . Поэтому  $q_k \dots q_1 U = pT$  для некоторого  $p \in R_T$ .  $\square$

Следствие 5.1

Перестановка  $g \in S_n$  тогда и только тогда имеет вид  $g = pq$  для некоторых  $p \in R_T$ ,  $q \in C_T$ , когда никакие два элемента из одной строки  $T$  не лежат в одном столбце  $gT$ , и в этом случае представление перестановки  $g \in S_n$  в виде  $g = pq$  с  $p \in R_T$  и  $q \in C_T$  единственно.

Доказательство. Для любых  $p \in R_T$  и  $q \in C_T$  элементы из одной строки заполнения  $T$  лежат в разных столбцах заполнения  $qT$ , и  $p$  переставляет эти элементы между собою, оставляя их лежать в разных столбцах заполнения  $pqT$ . Наоборот, если никакие два элемента из одной строки заполнения  $T$  не лежат в одном столбце заполнения  $U = gT$ , то по лем. 5.1 найдутся такие  $p \in R_T$  и  $q' \in C_U$ , что  $pT = q'U = q'gT$ . Поэтому  $p = q'g$ . Записывая перестановку  $q' \in C_{gT} = gC_Tg^{-1}$  в виде  $gqg^{-1}$ , где  $q \in C_T$ , получаем  $g = pq^{-1}$ , как и требовалось. Единственность разложения  $g = pq$  вытекает из того, что  $R_T \cap C_T = \{e\}$ .  $\square$

Упражнение 5.3. Покажите, что перестановка  $g \in S_n$  имеет вид  $g = q'p'$  для некоторых  $q' \in C_T$ ,  $p' \in R_T$ , если и только если никакие два элемента из одной строки  $gT$  не лежат в одном столбце  $T$ , и в этом случае представление  $g = q'p'$  тоже единственно.

**5.2. Симметризаторы Юнга.** Лежащие в групповой алгебре  $\mathbb{C}S_n$  элементы

$$r_T = \sum_{\sigma \in R_T} \sigma, \quad c_T = \sum_{\sigma \in C_T} \text{sgn}(\sigma) \sigma, \quad (5-1)$$

$$s_T = r_T c_T = \sum_{p \in R_T} \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(q) pq \quad (5-2)$$

называются, соответственно, *строчным*, *столбцовым* и *полным симметризаторами Юнга*.

Пример 5.1

Для однострочного заполнения  $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & n \end{bmatrix}$  получаем  $R_T = S_n$ ,  $C_T = e$ ,  $c_T = 1$ , а

$$s_T = r_T = \text{sym}_n = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma = \pi_1$$

является проектором на тривиальный изотипный идеал в  $\mathbb{C}S_n$ . Аналогично, для одностолбцового заполнения

$$T = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$$

получаем  $R_T = e$ ,  $C_T = S_n$ ,  $r_T = 1$ , а

$$s_T = c_T = \text{alt}_n = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma = \pi_{\text{sgn}}$$

является проектором на знаковый изотипный идеал в  $\mathbb{C}S_n$ . Для заполнения

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

<sup>1</sup>См. раздел 11.3 на с. 194 лекций [Алг 1].

получаем

$$r_T = e + |1, 3\rangle, \quad c_T = e - |1, 2\rangle, \quad s_T = e - |1, 2\rangle + |1, 3\rangle - |1, 2, 3\rangle.$$

Обратите внимание, что  $s_T^2 = 3s_T$  (проверьте!).

**УПРАЖНЕНИЕ 5.4.** Убедитесь, что  $S_3$ -орбита симметризатора  $s_T$  заполнения (5-3) линейно порождает в  $\mathbb{C}S_3$  двумерное инвариантное подпространство, на котором  $S_3$  действует группой треугольника.

**5.2.1. Неприводимые левые идеалы.** Прямо из определений (5-1) – (5-2) вытекают следующие очевидные свойства симметризаторов Юнга:

$$\forall g \in S_n \quad r_{gT} = gr_Tg^{-1}, \quad c_{gT} = gc_Tg^{-1} \quad \text{и} \quad s_{gT} = gs_Tg^{-1} \quad (5-4)$$

$$\forall p \in R_T \quad pr_T = r_Tp = r_T \quad \text{и} \quad \forall q \in C_T \quad \text{sgn}(q)qc_T = \text{sgn}(q)c_Tq = c_T \quad (5-5)$$

$$\forall p \in R_T \quad \text{и} \quad \forall q \in C_T \quad \text{sgn}(q)ps_Tq = s_T. \quad (5-6)$$

Замечательно, что полный симметризатор  $s_T \in \mathbb{C}S_n$  однозначно с точностью до пропорциональности определяется свойством (5-6).

**ЛЕММА 5.2**

Векторное подпространство  $E_T = \{f \in \mathbb{C}S_n \mid \forall p \in R_T \quad \forall q \in C_T \quad \text{sgn}(q)pfq = f\}$  одномерно и линейно порождается симметризатором  $s_T$ .

**Доказательство.** Пусть  $f = \sum_{g \in S_n} x_g g \in E_T$ . Покажем, что  $f = x_e s_T$ . Условие  $\text{sgn}(q)pfq = f$  означает, что  $x_{pgq} = \text{sgn}(q)x_g$  для всех  $g \in S_n$ ,  $p \in R_T$  и  $q \in C_T$ . Полагая  $g = e$ , заключаем, что  $x_{pq} = \text{sgn}(q)x_e$  и  $f = x_e s_T + \sum_{g \notin R_T C_T} x_g g$ . Остаётся убедиться, что в последней сумме все  $x_g = 0$ . Если  $g \notin R_T C_T$ , то по [сл. 5.1](#) найдутся два элемента, лежащие в одной строке заполнения  $T$  и в одном столбце заполнения  $gT$ . Транспозиция  $\tau \in S_n$  этих двух элементов лежит и в  $R_T$ , и в  $C_{gT} = gC_Tg^{-1}$ . Из второго вытекает, что  $g^{-1}\tau g \in C_T$ . Полагая  $p = \tau$ ,  $q = g^{-1}\tau g$  в равенстве  $x_{pgq} = \text{sgn}(q)x_g$ , получаем  $x_g = -x_g$ , откуда  $x_g = 0$ .  $\square$

**ЛЕММА 5.3**

Имеют место равенства  $s_T \mathbb{C}S_n s_T = \mathbb{C} s_T$  и  $s_T^2 = n_\lambda s_T$ , где число  $n_\lambda = n! / \dim(\mathbb{C}S_n s_T)$  рационально, положительно и зависит только от формы  $\lambda = \lambda(T)$  заполнения  $T$ .

**Доказательство.** Из равенств (5-5) – (5-6) вытекает, что при любом  $f \in \mathbb{C}S_n$  элемент  $s_T f s_T$  обладает свойством (5-6) и тем самым лежит в одномерном пространстве  $E_T = \mathbb{C} s_T$ . В частности,  $s_T^2 = n_T s_T$  для некоторого  $n_T \in \mathbb{C}$ . Чтобы найти  $n_T$ , вычислим двумя способами след оператора  $\mathbb{C}S_n \rightarrow \mathbb{C}S_n$  правого умножения на элемент  $s_T$ :  $f \mapsto f s_T$ . С одной стороны, из формулы (5-2) вытекает<sup>1</sup>, что для любого  $g \in S_n$  коэффициент при  $g$  у произведения  $g s_T$  равен единице, откуда  $\text{tr}(s_T) = |S_n| = n!$ . С другой стороны, левый идеал  $\mathbb{C}S_n s_T$  является  $S_n$ -подмодулем левого регулярного представления  $S_n$ . Так как последнее вполне приводимо, существует такой  $S_n$ -подмодуль  $W \subset \mathbb{C}S_n$ , что  $\mathbb{C}S_n = W \oplus \mathbb{C}S_n s_T$ . Правое умножение на  $s_T$  переводит  $W \subset \mathbb{C}S_n$  внутрь  $\mathbb{C}S_n s_T$ , а на идеале  $\mathbb{C}S_n s_T$  действует как умножение на  $n_T$ . Поэтому  $\text{tr}(s_T) = n_T \dim(\mathbb{C}S_n s_T)$ . Следовательно, число  $n_T = n! / \dim(\mathbb{C}S_n s_T)$  рационально и положительно. Наконец, из равенства

<sup>1</sup>Так как  $R_T \cap C_T = \{e\}$ , все слагаемые в сумме (5-2) являются различными элементами группы  $S_n$ , взятыми со знаком  $\pm 1$ , причём элемент  $e = ee$  берётся с плюсом.

$s_{gT} = gs_Tg^{-1}$  вытекает, что  $s_{gT}^2 = gs_T^2g^{-1} = n_Tgs_Tg^{-1} = n_Ts_{gT}$ . Поэтому число  $n_T = n_{\lambda(T)}$  зависит только от формы  $\lambda = \lambda(T)$  заполнения  $T$ .  $\square$

ЛЕММА 5.4

Если форма стандартного заполнения  $T$  лексикографически больше, чем форма стандартного заполнения  $U$ , то  $r_T\mathbb{C}S_n c_U = c_U\mathbb{C}S_n r_T = s_T\mathbb{C}S_n s_U = 0$ .

Доказательство. Достаточно убедиться, что  $r_Tgc_U = c_Ugr_T = 0$  для всех  $g \in S_n$ . Пусть для начала  $g = e$ . По лем. 5.1 какие-то два элемента из одной строки заполнения  $T$  лежат в одном столбце заполнения  $U$ . Транспозиция  $\tau \in S_n$  этих двух элементов лежит как в  $R_T$ , так и в  $C_U$ . Поэтому  $r_Tc_U = (r_T\tau)c_U = r_T(\tau c_U) = -r_Tc_U$  и  $c_Ur_T = -(c_U\tau)r_T = -c_U(\tau r_T) = -c_Ur_T$ , откуда  $r_Tc_U = c_Ur_T = 0$ . Теперь и для любого  $g \in S_n$  получаем  $r_Tgc_U = r_Tgc_Ug^{-1}g = (r_Tc_{gU})g = 0$  и  $c_Ugr_T = c_Ugr_Tg^{-1}g = (c_Ur_{gT})g = 0$ .  $\square$

ТЕОРЕМА 5.1

Представление  $S_n$  левыми умножениями в идеале  $V_T = \mathbb{C}S_n s_T$  неприводимо. Два таких представления  $V_T$  и  $V_U$  изоморфны тогда и только тогда, когда заполнения  $T$  и  $U$  имеют одинаковую форму  $\lambda = \lambda(T) = \lambda(U)$ . Если для каждой  $n$ -клеточной диаграммы Юнга  $\lambda$  произвольным образом зафиксировать некоторое стандартное заполнение  $T_\lambda$ , то неприводимые представления  $V_\lambda = V_{T_\lambda}$  составят полный список попарно неизоморфных неприводимых представлений  $S_n$ .

Доказательство. Пусть  $W \subset V_T$  является  $S_n$ -инвариантным подмодулем. Перестановочный с левым умножением на  $S_n$  проектор  $\pi_W : \mathbb{C}S_n \rightarrow W$  представляет собой оператор правого умножения на элемент  $w = \pi_W(1) \in W$ , поскольку  $\pi_W(x) = x\pi_W(1) = xw$  для всех  $x \in \mathbb{C}S_n$ . Так как  $s_TW \subset s_TV_T = s_T\mathbb{C}S_n s_T = \mathbb{C}s_T$ , для левого действия элемента  $s_T$  на подмодуле  $W$  имеются ровно две возможности: либо  $s_TW = 0$ , либо  $s_TW = \mathbb{C}s_T$ . В первом случае  $WW \subset V_TW = \mathbb{C}S_n s_TW = 0$ , откуда  $w^2 = 0$ , а значит, и  $W = 0$ , поскольку правое умножение на  $w$  тождественно действует на  $W = \mathbb{C}S_n w$ . Во втором случае  $s_T \in s_TW \subset W$ , откуда  $V_T = \mathbb{C}S_n s_T \subset W$ , т. е.  $W = V_T$ . Таким образом, модуль  $V_T$  неприводим. Если заполнения  $T$  и  $U$  имеют разные формы — скажем, форма заполнения  $T$  лексикографически больше формы заполнения  $U$ , то по лем. 5.4 левое умножение на  $s_T$  аннулирует модуль  $V_U$ , тогда как на модуле  $V_T$  оно, согласно лем. 5.3, действует нетривиально: элемент  $s_T \in V_T$  является собственным вектором левого умножения на  $s_T$  с ненулевым собственным значением  $n_{\lambda(T)}$ . Так как число попарно неизоморфных неприводимых представлений  $V_{T_\lambda}$  равно числу классов сопряжённости в  $S_n$ , мы получаем последнее утверждение теоремы. Если заполнение  $U$  имеет ту же форму  $\lambda$ , что и  $T_\lambda$ , то неприводимое представление  $V_U$ , будучи не изоморфным ни одному из представлений  $V_{T_\mu}$  с  $\mu \neq \lambda$ , изоморфно именно представлению  $V_{T_\lambda}$ .  $\square$

**5.2.2. Симметризаторы  $s'_T = c_T r_T$ .** Множества  $R_T C_T$  и  $C_T R_T$ , вообще говоря, различны. Например, для стандартного заполнения  $T = \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 \end{smallmatrix}$  цикл  $|132\rangle = |12\rangle \circ |13\rangle$  входит в  $R_T C_T$  и не входит в  $C_T R_T$ , а цикл  $|123\rangle = |13\rangle \circ |12\rangle$ , наоборот, входит в  $C_T R_T$  и не входит в  $R_T C_T$ . Поэтому перестановка сомножителей в симметризаторе  $s_T = r_T c_T$  даёт другой симметризатор

$$s'_T = c_T r_T = \sum_{p \in R_T} \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(q) qp, \quad (5-7)$$

получающийся применением к  $s_T \in \mathbb{C}S_n$  антиподального антиавтоморфизма

$$\alpha : \mathbb{C}S_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}S_n, \quad \sum_{g \in G} x_g g \mapsto \sum_{g \in G} x_g g^{-1}, \quad (5-8)$$

который оборачивает порядок сомножителей в произведениях, но переводит в себя строчный и столбцовый симметризаторы  $r_T$  и  $c_T$ .

УПРАЖНЕНИЕ 5.5. Сформулируйте и докажите для  $s'_T$  аналог форм. (5-6) на стр. 50, а также аналоги лем. 5.2 – лем. 5.4 и теор. 5.1 на стр. 51.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.1

Представления  $S_n$  левыми умножениями в идеалах  $V_T = \mathbb{C}S_n s_T$  и  $V'_T = \mathbb{C}S_n s'_T$  изоморфны.

Доказательство. Правые умножения на  $c_T$  и  $r_T$  задают гомоморфизмы левых  $S_n$ -модулей

$$V'_T = \mathbb{C}S_n c_T r_T \xrightleftharpoons[xr_T \leftarrow x]{x \mapsto xc_T} \mathbb{C}S_n r_T c_T = V_T$$

Композиция  $x \mapsto xr_T c_T = xs_T$  действует на  $V_T = \mathbb{C}S_n s_T$  умножением на ненулевую константу  $n_{\lambda(T)}$ . Таким образом, операторы правого умножения на  $n_{\lambda}^{-1/2} c_T$  и  $n_{\lambda}^{-1/2} r_T$  являются взаимно обратными изоморфизмами представлений.  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 5.2

Неприводимые представления  $V_{\lambda}$  и  $V_{\lambda^t}$ , отвечающие транспонированным диаграммам  $\lambda$  и  $\lambda^t$ , получаются друг из друга тензорным умножением на одномерное знаковое представление.

Доказательство. Фиксируем какое-либо стандартное заполнение  $T$  формы  $\lambda$  и транспонированное заполнение  $T^t$  транспонированной диаграммы  $\lambda^t$ . Тогда  $R_{T^t} = C_T$ ,  $C_{T^t} = R_T$  и

$$s_{T^t} = \sum_{p \in R_T} \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(p) qp = \sum_{p \in R_T} \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(q) \text{sgn}(pq) qp = \sigma(s'_T),$$

где  $\sigma : \mathbb{C}S_n \rightarrow \mathbb{C}S_n$  обозначает *знаковый автоморфизм* групповой алгебры, действующий на базис из групповых элементов по правилу  $g \mapsto \text{sgn}(g)g$ . Тензорное произведение представления  $V_{\lambda}$  на одномерное знаковое представление изоморфно представлению в левом идеале  $V'_T = \mathbb{C}S_n s'_T$  по правилу  $g : xs'_T \mapsto \text{sgn}(g)gxs'_T$ . Знаковый автоморфизм  $\sigma$  изоморфно отображает пространство этого представления на  $V_{\lambda^t} = \mathbb{C}S_n s_{T^t}$ , превращая действие в левое умножение на  $g : \sigma(x)s_{T^t} \mapsto g\sigma(x)s_{T^t}$ .  $\square$

**5.3. Модуль таблоидов.** Орбита стандартного заполнения  $T$  под действием строчной подгруппы  $R_T$  называется *таблоидом* формы  $\lambda$  и обозначается через  $\{T\}$ . Действие симметрической группы на заполнениях  $g : T \mapsto gT$  корректно спускается до действия  $g : \{T\} \mapsto \{gT\}$  на таблоидах, так как  $gR_T T = gR_T g^{-1}gT = R_{gT}gT$ . Возникающее таким образом перестановочное представление группы  $S_n$  на пространстве формальных комплексных линейных комбинаций таблоидов формы  $\lambda$  называется *модулем таблоидов* и обозначается  $M_{\lambda}$ . Так как таблоиды формы  $\lambda$  биективно соответствуют левым смежным классам  $gR_T \in S_n/R_T$  и действие  $S_n$  на таблоидах совпадает с действием на смежные классы, модуль таблоидов  $M_{\lambda} = \text{ind}_{R_T}^{S_n} \mathbb{1}$  индуцирован тривиальным одномерным представлением подгруппы  $R_T \subset S_n$ .

УПРАЖНЕНИЕ 5.6. Покажите, что представление  $S_n$  в пространстве  $M_{\lambda}$  изоморфно представлению  $S_n$  левыми умножениями в идеале  $\mathbb{C}S_n r_T$ .

Характер модуля  $M_\lambda$  обозначается через  $\psi_\lambda$ . Напомню<sup>1</sup>, что многочлен  $f \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$  называется *симметрическим*, если  $f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$  для всех  $\sigma \in S_n$ . Кольцо симметрических многочленов является свободным  $\mathbb{Z}$ -модулем с базисом из *мономиальных* симметрических многочленов

$$m_\lambda = (\text{сумма всех различных мономов из } S_n\text{-орбиты монома } x_1^{\lambda_1} \dots x_n^{\lambda_n}), \quad (5-9)$$

занумерованных диаграммами Юнга  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  из  $n$  строк, часть из которых может иметь нулевую длину. Симметрический многочлен  $p_k(x_1, \dots, x_n) = x_1^k + \dots + x_n^k$  называется  $k$ -м *многочленом Ньютона*. Для каждой диаграммы Юнга  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_m)$  мы полагаем

$$p_\mu = p_{\mu_1} \dots p_{\mu_m} = p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n},$$

где  $m_i = m_i(\mu)$  означает количество строк длины  $i$  в диаграмме<sup>2</sup>  $\mu$ .

Предложение 5.2

Значение  $\psi_\lambda(C_\mu)$  характера модуля таблоидов формы  $\lambda$  на состоящем из всех перестановок циклового типа  $\mu$  классе сопряжённости  $C_\mu \in \text{Cl}(S_n)$  равно коэффициенту при  $m_\lambda$  в разложении многочлена  $p_\mu$  по мономиальному базису (5-9).

Доказательство. Пусть, как и выше,  $m_i = m_i(\mu)$  означает количество строк длины  $i$  в диаграмме  $\mu$ . Тогда

$$p_i(x_1, \dots, x_n)^{m_i} = (x_1^i + \dots + x_n^i)^{m_i} = \sum \frac{m_i!}{q_{i1}! \dots q_{in}!} x_1^{iq_{i1}} \dots x_n^{iq_{in}}$$

где сумма берётся по всем наборам неотрицательных целых чисел  $q_{i1}, \dots, q_{in}$  с  $\sum_j q_{ij} = m_i$ . Таким образом, коэффициент при  $x_1^{\lambda_1} \dots x_n^{\lambda_n}$  у многочлена  $p_\mu = p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n}$  равен

$$\sum_{q_{ij}} m_1! \dots m_n! / \prod_{ij} q_{ij}!, \quad (5-10)$$

где суммирование идёт по всем таким наборам целых чисел  $q_{ij} \geq 0$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , что

$$\sum_j q_{ij} = m_i \quad \text{и} \quad \sum_i i q_{ij} = \lambda_j. \quad (5-11)$$

С другой стороны, согласно установленной в [предл. 4.4](#) на стр. 40 формуле (4-6) для характера индуцированного представления,

$$\psi_\lambda(C_\mu) = [S_n : R_T] |C_\mu \cap R_T| / |C_\mu|, \quad (5-12)$$

где  $[S_n : R_T] = n! / \prod_j \lambda_j!$ ,  $|C_\mu| = n! / \prod_i i^{m_i} m_i!$ , а пересечение  $C_\mu \cap R_T$  распадается в объединение непересекающихся классов  $R_T$ -сопряжённости  $D_q$ , каждый из которых состоит из перестановок циклового типа  $\mu$ , в которых  $q_{ij}$  из  $m_i$  циклов длины  $i$  заполнены элементами  $j$ -той строки из  $T$ . Эти классы также нумеруются удовлетворяющими условиям (5-11) наборами неотрицательных целых чисел  $q = \{q_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq n}$ . Стабилизатор перестановки  $g \in D_q$  при сопряжении подгруппой  $R_T$  равен произведению  $\prod q_{ij}!$  перестановок между собой циклов одинаковой длины как единого целого и  $\prod i^{m_i}$  циклических сдвигов внутри этих циклов. Тем самым,  $|C_\mu \cap R_T| = \sum_q |D_q| = \sum_q \prod_j \lambda_j! / \prod_{ij} i^{m_i} q_{ij}!$ . Подставляя всё это в (5-12) и сокращая общие множители числителя и знаменателя, получаем (5-10).  $\square$

<sup>1</sup>См. пример 5.17 на с. 98 лекций [\[Алг 1\]](#).

<sup>2</sup>Ср. с упражнением 5.28 на с. 99 лекций [\[Алг 1\]](#).

**5.4. Модуль Шпехта.** Для каждого заполнения  $T$  формы  $\lambda$  рассмотрим в модуле таблоидов  $M_\lambda$  вектор

$$v_T = c_T\{T\} = \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(q)\{qT\}. \quad (5-13)$$

Поскольку ни при каком  $q \in C_T$  никакие два элемента из одного столбца  $T$  не могут оказаться в одной строке  $qT$ , равенство  $q_1 T = p q_2 T$  невозможно ни при каких  $q_1, q_2 \in C_T$  и  $p \in R_{q_2 T}$ , т. е. все слагаемые в правой сумме (5-13) суть *различные* базисные векторы пространства таблоидов  $M_\lambda$ , взятые с коэффициентами  $\pm 1$ . В частности, каждый из векторов  $v_T$  отличен от нуля. Линейная оболочка векторов (5-13), полученных из всех возможных заполнений  $T$  формы  $\lambda$ , является  $S_n$ -подмодулем в  $M_\lambda$ , так как  $g v_T = g c_T\{T\} = g c_T g^{-1}\{gT\} = c_{gT}\{gT\} = v_{gT}$  для всех  $g \in S_n$ . Этот подмодуль обозначается  $S_\lambda$  и называется *модулем Шпехта*.

ЛЕММА 5.5

Если форма  $\lambda$  заполнения  $T$  не является строго доминирующей диаграмму  $\mu$ , то

$$c_T M_\mu = \begin{cases} 0 & \text{при } \mu \neq \lambda \\ \mathbb{C} v_T & \text{при } \mu = \lambda. \end{cases}$$

Доказательство. Если в пересечении  $R_U \cap C_T$  имеется хоть одна транспозиция  $\tau$ , то

$$c_T\{U\} = c_T\{\tau U\} = c_T \tau\{U\} = -c_T\{U\}, \quad (5-14)$$

откуда  $c_T\{U\} = 0$ . Если в условиях нашей леммы такой транспозиции нет, то по [лем. 5.1](#) на стр. 48 заполнения  $U$  и  $T$  имеют одинаковую форму  $\lambda$  и  $pU = qT$  для некоторых  $p \in R_U$  и  $q \in C_T$ . В этом случае  $c_T\{U\} = c_T\{pU\} = c_T\{qT\} = c_T q\{T\} = \text{sgn}(q)c_T\{T\} = \pm v_T$ .  $\square$

ТЕОРЕМА 5.2

Модуль Шпехта  $S_\lambda$  изоморфен неприводимому представлению  $V_\lambda$  левыми умножениями в идеале  $\mathbb{C}S_n s_T$ , построенному по произвольному заполнению  $T$  формы  $\lambda$ .

Доказательство. Покажем сначала, что  $S_\lambda$  неприводим. Пусть имеется разложение  $S_\lambda = V \oplus W$  в сумму  $S_n$ -подмодулей. Тогда оператор  $c_T$ , построенный по заполнению  $T$  формы  $\lambda$ , переводит каждое из слагаемых в себя. Так как  $c_T S_\lambda \subset c_T M_\lambda = \mathbb{C} v_T$  по [лем. 5.5](#), ненулевой вектор  $v_T$  лежит ровно в одном из слагаемых — скажем, в  $V$ . Но тогда  $V$  содержит и все остальные векторы  $v_{gT} = g v_T$ , а значит, совпадает с  $S_\lambda$ . При  $\mu \neq \lambda$  неприводимые представления  $S_\lambda$  и  $S_\mu$  не изоморфны: если  $\lambda$  лексикографически меньше  $\mu$ , то по [лем. 5.5](#) оператор  $c_T$  аннулирует подмодуль  $S_\mu \subset M_\mu$ , а на модуле  $S_\lambda$  действует нетривиально, ибо  $c_T v_T = c_T c_T\{T\} = |C_T| c_T\{T\} = |C_T| v_T$ . Из сказанного вытекает, что модуль  $S_\lambda$  изоморфен ровно одному из неприводимых представлений  $V_\mu = \mathbb{C}S_n s_U$ , где  $U$  — любое заполнение формы  $\mu$ . Поскольку по [лем. 5.4](#) левое умножение на  $c_T$  аннулирует все идеалы  $V_\mu$  с лексикографически меньшими, чем  $\lambda$  диаграммами  $\mu$ , мы заключаем, что  $S_\lambda \simeq V_\lambda$ .  $\square$

СЛЕДСТВИЕ 5.3

В разложении представления  $M_\lambda$  в сумму неприводимых встречаются только модули  $S_\mu$  с  $\mu \triangleright \lambda$ , а также модуль  $S_\lambda$ , входящий в  $M_\lambda$  с кратностью 1.

Доказательство. Так как оператор  $c_T$  переводит  $M_\lambda$  в подмодуль Шпехта и нетривиально действует на последнем, в разложении модуля  $M_\lambda$  в прямую сумму простых есть ровно одно слагаемое, изоморфное  $S_\lambda$ . Если существует  $S_n$ -линейное вложение  $S_\mu \hookrightarrow M_\lambda$ , то оператор  $c_U$ , отвечающий произвольному заполнению  $U$  формы  $\mu$ , нетривиально действует на  $M_\lambda$ . Но в силу лем. 5.5  $c_U M_\lambda = 0$ , когда  $\mu$  не доминирует  $\lambda$ .  $\square$

Замечание 5.1. Можно показать, что векторы  $v_T$ , где  $T$  пробегает такие заполнения формы  $\lambda$ , числа в которых возрастают слева направо в каждой строке и сверху вниз в каждом столбце, образуют базис модуля Шпехта  $S_\lambda$ . Такие заполнения называют *стандартными таблицами Юнга* формы  $\lambda$ . Количество стандартных таблиц формы  $\lambda$  обозначается  $d_\lambda$  и может быть вычислено по *правилу крюков*:

$$d_\lambda = \dim S_\lambda = \frac{n!}{\prod_{c \in \lambda} |\Gamma(c)|},$$

где произведение берётся по всем клеткам  $c$  диаграммы  $\lambda$ , а  $|\Gamma(c)|$  обозначает *длину крюка* с вершиной в  $c$ , т. е. количество клеток в  $\Gamma$ -образной поддиаграмме, состоящей из клетки  $c$  и всех клеток ниже  $c$  в том же столбце и всех клеток правее  $c$  в той же строке. Например, длины крюков диаграммы  $\lambda = (4, 2, 1)$  суть

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 6 & 4 & 2 & 1 \\ \hline 3 & 1 & & \\ \hline 1 & & & \\ \hline \end{array},$$

откуда размерность модуля Шпехта  $S_{(4,2,1)}$  группы  $S_7$  равна  $7!/(6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2) = 7 \cdot 5 = 35$ . Доказательства этих и многих других красивых соотношений основаны на возможности отождествить прямую сумму  $\mathfrak{R} \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{k \geq 0} R_{S_k}$  аддитивных групп колец представлений *всех* симметрических групп с  $\mathbb{Z}$ -модулем  $\Lambda$  симметрических функций от бесконечного числа переменных  $x_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , так, что классы изоморфизма модулей таблоидов  $M_\lambda$  переходят в полные симметрические многочлены<sup>1</sup>  $h_\lambda = h_{\lambda_1} \dots h_{\lambda_n}$ , классы изоморфизма модулей Шпехта  $S_\lambda$  — в многочлены Шура

$$s_\lambda = \frac{\det(x_j^{n-i+l_i})}{\det(x_j^{n-i})} = \det \begin{pmatrix} x_1^{n-1+l_1} & x_2^{n-1+l_1} & \dots & x_n^{n-1+l_1} \\ x_1^{n-2+l_2} & x_2^{n-2+l_2} & \dots & x_n^{n-2+l_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{\lambda_n} & x_2^{\lambda_n} & \dots & x_n^{\lambda_n} \end{pmatrix} : \det \begin{pmatrix} x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

а задаваемая тензорным умножением на одномерное знаковое представление инволюция на классах представлений — в каноническую инволюцию  $\omega$  на кольце симметрических функций  $\Lambda$ , переводящую друг в друга многочлены Шура, отвечающие транспонированным диаграммам Юнга:  $s_\lambda \leftrightarrow s_{\lambda^t}$ , а также полные и элементарные симметрические многочлены:  $h_\lambda \leftrightarrow e_\lambda$ . Произвольный  $S_n$ -модуль  $U$  переходит при этом отождествлении в симметрическую функцию

$$\text{ch}_U \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{|\mu|=n} z_\mu^{-1} \chi_U(C_\mu) \cdot p_\mu,$$

<sup>1</sup>Для каждого целого неотрицательного  $k$  *полным симметрическим многочленом*  $h_k$  называется сумма всех мономов от  $x_i$  полной степени  $k$ . Иными словами,  $\prod_i (1 + x_i t) = \sum_{k \geq 0} h_k(x) t^k$ . Как всегда, для диаграммы Юнга  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , содержащей при каждом  $k$  ровно  $m_k$  клеток длины  $k$ , полагают  $h_\lambda = \prod_i h_{\lambda_i} = \prod_k h_k^{m_k}$ .

где  $z_\lambda = \prod_i m_i(\lambda)! i^{m_i(\lambda)}$  обозначает порядок централизатора перестановки циклового типа<sup>1</sup>  $\lambda$  в симметрической группе  $S_n$ ,  $\chi_U(C_\mu)$  — значение характера представления  $U$  на классе сопряжённости  $C_\mu \subset S_n$ , состоящем из перестановок циклового типа  $\mu$ , а  $p_\mu = p_{\mu_1} \cdots p_{\mu_n}$  — симметрический многочлен Ньютона<sup>2</sup>. При этом умножение на кольце симметрических функций  $\Lambda$  превращается в умножение Литтлвуда–Ричардсона на  $\mathfrak{R}$ , которое переводит классы изоморфизмов линейных представлений  $\varphi : S_k \rightarrow \mathrm{GL}(U)$  и  $\psi : S_m \rightarrow \mathrm{GL}(W)$  в представление  $\mathrm{ind}_{S_k \times S_m}^{S_{k+m}} \varphi \boxtimes \psi$ , индуцированное представлением  $\varphi \boxtimes \psi : S_k \times S_m \rightarrow \mathrm{GL}(U \otimes W)$  группы  $S_k \times S_m$ , вложенной в  $S_{k+m}$  как подгруппа, сохраняющая разбиение  $\{1, \dots, k+m\} = \{1, \dots, k\} \sqcup \{k+1, \dots, k+m\}$ . А скалярное произведение на  $\mathfrak{R} = \bigoplus R_{S_k}$ , равное прямой ортогональной сумме канонических скалярных произведений характеров на каждом  $R_{S_k}$ , задаёт на кольце симметрических функций  $\Lambda$  скалярное произведение, для которого полиномы Шура  $s_\lambda$  составляют ортонормальный базис, а полиномы Ньютона — ортогональный базис векторного пространства  $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \Lambda$  со скалярными квадратами  $(p_\lambda, p_\lambda) = z_\lambda$ . Подробнее об этом см. в §§ 7, 8, 11 [моего учебника](#), или в книгах: У. Фултон, Таблицы Юнга и их применение в... , М., «МЦНМО» и W. Fulton, J. Harris, Representation Theory. A first course, Springer-Verlag, 1991.

**5.5. Соответствие Шура–Вейля.** Зафиксируем векторное пространство  $V$  конечной размерности  $d \geq 2$  над алгебраически замкнутым полем  $\mathbb{k}$  характеристики нуль. Симметрическая группа  $S_n$  действует на  $V^{\otimes n}$  перестановками сомножителей в разложимых тензорах:

$$\sigma(v_1 \otimes \dots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)} \quad \text{для всех } \sigma \in S_n, \quad (5-15)$$

а полная линейная группа  $\mathrm{GL}(V)$  — тензорными степенями линейных операторов<sup>4</sup>:

$$f : v_1 \otimes \dots \otimes v_n \mapsto f^{\otimes n}(v_1 \otimes \dots \otimes v_n) = f v_1 \otimes \dots \otimes f v_n \quad \text{для всех } f \in \mathrm{GL}(V). \quad (5-16)$$

Эти действия коммутируют друг с другом и тем самым задают представление группы  $\mathrm{GL}(V) \times S_n$  в пространстве  $V^{\otimes n}$  по правилу

$$(f, \sigma) : v_1 \otimes \dots \otimes v_n \mapsto f(v_{\sigma^{-1}(1)}) \otimes \dots \otimes f(v_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Следуя доказательству [теор. 4.1](#) на стр. 35, рассмотрим изотипное разложение пространства  $V^{\otimes n}$  как модуля над  $S_n$ :

$$V^{\otimes n} = \bigoplus_{|\lambda|=n} W_\lambda, \quad (5-17)$$

где  $\lambda$  пробегает  $n$ -клеточные диаграммы Юнга. Про тензоры, лежащие в изотипной компоненте  $W_\lambda$ , говорят, что они имеют *тип симметрии*  $\lambda$ , а само разложение (5-17) называется разложением тензоров по типам симметрии. Будучи перестановочными с операторами из  $S_n$ , операторы из  $\mathrm{GL}(V)$  переводят каждый изотипный  $S_n$ -подмодуль  $W_\lambda$  в себя. Тем самым, каждое подпространство  $W_\lambda \subset V^{\otimes n}$  тоже является представлением группы  $\mathrm{GL}(V) \times S_n$ . Пусть, как и выше,  $S_\lambda$  обозначает модуль Шпехта, т. е. неприводимый  $S_n$ -модуль, отвечающий диаграмме  $\lambda$ .

<sup>1</sup> См. пример 10.15 на с. 181 лекций [\[Алг 1\]](#).

<sup>2</sup> См. обозначения, введённые перед [предл. 5.2](#) на стр. 53.

<sup>3</sup> Обратите внимание, что набор занумерованных векторов  $v_1, \dots, v_n$  есть не что иное, как отображение  $v : \{1, \dots, n\} \rightarrow V$ . Левое действие группы  $S_n$  автоморфизмов множества  $\{1, \dots, n\}$  на таких отображениях задаётся правилом  $\sigma v(i) = v(\sigma^{-1}(i))$ . При этом  $i$ -й слева элемент набора  $v$  оказывается в наборе  $\sigma(v)$  на  $\sigma(i)$ -м слева месте.

<sup>4</sup> Иными словами,  $\mathrm{GL}(V)$ -модуль  $V^{\otimes n}$  является  $n$ -й тензорной степенью тавтологического представления группы  $\mathrm{GL}(V)$  в пространстве  $V$ .

По [предл. 1.4](#) на стр. 11 каноническая свёртка

$$c_\lambda : \text{Hom}_{S_n}(S_\lambda, V^{\otimes n}) \otimes S_\lambda \xrightarrow{\sim} W_\lambda \subset V^{\otimes n}, \quad \varphi \otimes u \mapsto \varphi(u), \quad (5-18)$$

является изоморфизмом. Если рассматривать  $\text{Hom}_{S_n}(S_\lambda, V^{\otimes n}) \otimes S_\lambda$  как внешнее тензорное произведение неприводимого представления  $S_\lambda$  группы  $S_n$  и представления группы  $\text{GL}(V)$  на пространстве  $S^\lambda V \stackrel{\text{def}}{=} \text{Hom}_{S_n}(S_\lambda, V^{\otimes n})$  по правилу  $f : \varphi \mapsto f^{\otimes n} \circ \varphi$ , то изоморфизм (5-18) будет изоморфизмом  $\text{GL}(V) \times S_n$ -модулей.

УПРАЖНЕНИЕ 5.7. Убедитесь в этом.

$\text{GL}(V)$ -модуль  $S^\lambda V$  называется *представлением Шура* полной линейной группы  $\text{GL}(V)$ , а сопоставление векторному пространству  $V$  пространства  $S^\lambda V$ , в котором происходит это представление, называется *функтором Шура*. Функторы Шура, отвечающие однострочной диаграмме  $\lambda = (n)$  и одностолбцовой диаграмме  $\mu = (1^n) = (1, \dots, 1)$ , сопоставляют векторному пространству  $V$  его  $n$ -тые симметрическую и внешнюю степени  $S^\lambda V = S^n V$  и  $S^\mu V = \Lambda^n V$ , в которых оператор  $f \in \text{GL}(V)$  действует операторами  $S^n f$  и  $\Lambda^n f$  соответственно.

ЛЕММА 5.6

Операторы  $f^{\otimes n} : V^{\otimes n} \rightarrow V^{\otimes n}$ , где  $f \in \text{GL}(V)$ , линейно порождают алгебру  $\text{End}_{S_n}(V^{\otimes n})$ .

Доказательство. Цепочка канонических изоморфизмов

$$\text{End}(V^{\otimes n}) \simeq V^{\otimes n*} \otimes V^{\otimes n} \simeq V^{*\otimes n} \otimes V^{\otimes n} \simeq (V^* \otimes V)^{\otimes n} \simeq \text{End}(V)^{\otimes n}$$

отождествляет подалгебру  $\text{End}_{S_n}(V^{\otimes n}) \subset \text{End}(V^{\otimes n})$  с подпространством симметрических тензоров  $\text{Sym}^n(\text{End}(V)) \subset \text{End}(V)^{\otimes n}$ . Остаётся показать, что это пространство линейно порождается тензорами вида  $f^{\otimes n}$ , где  $f \in \text{GL}(V)$ . Если бы все такие тензоры лежали в какой-нибудь гиперплоскости, задаваемой ненулевой линейной формой  $\psi : \text{Sym}^n(\text{End}(V)) \rightarrow \mathbb{k}$ , то ненулевой многочлен  $\psi(f^{\otimes n}) \cdot \det(f)$  от оператора  $f$  задавал бы тождественно нулевую функцию на пространстве  $\text{End}(V)$ , что невозможно над бесконечным полем<sup>3</sup>.  $\square$

Предложение 5.3

Все представления Шура  $\text{GL}(V) \rightarrow \text{GL}(S^\lambda V)$  неприводимы.

Доказательство. Каждый линейный оператор  $F \in \text{End}(S^\lambda V)$  задаёт линейное преобразование  $F \otimes \text{Id} : \varphi \otimes u \mapsto F(\varphi) \otimes u$  пространства  $W_\lambda \simeq S^\lambda V \otimes S_\lambda$ , перестановочное с действием  $S_n$  на этом пространстве. По [лем. 5.6](#) это преобразование является линейной комбинацией лежащих в образе представления Шура операторов вида  $\varphi \otimes u \mapsto (f^{\otimes n} \circ \varphi) \otimes u$ , где  $f \in \text{End}(V)$ . Тем самым, образ представления Шура линейно порождает алгебру эндоморфизмов  $\text{End}(S^\lambda V)$ , и значит, оно неприводимо по [упр. 1.10](#).  $\square$

Следствие 5.4 (соответствие Шура–Вейля)

Представление группы  $\text{GL}(V) \times S_n$  в пространстве  $V^{\otimes n}$  полупросто, и его разложение в сумму неприводимых  $\text{GL}(V) \times S_n$ -модулей имеет вид

$$V^{\otimes n} = \bigoplus_{|\lambda|=n} S^\lambda V \boxtimes S_\lambda, \quad (5-19)$$

<sup>1</sup>Обратите внимание, что при  $n > d = \dim V$  внешняя степень будет нулевой.

<sup>2</sup>Ср. с доказательством предложения 14.6 на с. 235 лекций [\[Алт 1\]](#).

<sup>3</sup>Отметим, что алгебраически замкнутое поле автоматически бесконечно.

где суммирование идёт по всем  $n$ -клеточным диаграммам Юнга,  $S_\lambda$  обозначает  $S_n$ -модуль Шпехта<sup>1</sup>, а  $S^\lambda V$  обозначает представление Шура группы  $GL(V)$  левыми умножениями на  $f^{\otimes n}$ ,  $f \in GL(V)$ , в пространстве  $\text{Hom}_{S_n}(S_\lambda, V^{\otimes n})$ .

Доказательство. Выше мы видели, что каждая  $\lambda$ -изотипная компонента действия  $S_n$  на  $V^{\otimes n}$  является  $GL(V) \times S_n$ -подмодулем, изоморфным внешнему тензорному произведению  $S^\lambda V \boxtimes \boxtimes S_\lambda$  неприводимого  $S_n$ -модуля  $S_\lambda$  и представления Шура  $S^\lambda V$  группы  $GL(V)$ , неприводимого по предл. 5.3. Внешнее тензорное произведение неприводимых представлений неприводимо по теор. 4.1 на стр. 35.  $\square$

Замечание 5.2. Задаваемое диаграммами Юнга соответствие между неприводимыми представлениями симметрических и полных линейных групп называется *соответствием Шура-Вейля*. Обратите внимание, что в этом соответствии количество клеток  $n$  в диаграмме Юнга  $\lambda$  никак не связано с размерностью  $d$  пространства  $V$  и может быть любым. При этом некоторые пространства  $S^\lambda V$  могут оказаться нулевыми, как это происходит, к примеру, при  $n > \dim V$  с пространствами  $S^{(1^n)}V = \Lambda^n V$ , отвечающими однострочным диаграммам Юнга и соответствующими знаковым представлениям симметрических групп  $S_n$ . Можно показать, что ненулевые  $GL(V)$ -модули  $S^\lambda V$  не изоморфны друг другу при разных  $\lambda$  и с точностью до тензорных умножений на одномерные представления  $\det^m : GL(V) \rightarrow GL_1(\mathbb{k})$ , в которых  $f \in GL(V)$  действует умножением на  $\det^m(f)$ , ими исчерпываются все конечномерные неприводимые представления  $\varrho : GL(V) \rightarrow GL(W)$ , в которых элементы матрицы  $\varrho_f$  являются рациональными функциями элементов матрицы  $f$ . Подробнее об этом см. в книгах: Э. Б. Винберг, А. Л. Онищик. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам. М.: Наука, 1988, и W. Fulton, J. Harris. Representation Theory. A first course. Springer-Verlag, 1991.

Замечание 5.3. Пространство  $S^\lambda V$  допускает явное комбинаторное описание в терминах пространства  $V$ , подобное описаниям симметрической и внешней степеней пространства  $V$ , отвечающих однострочной и однострочной диаграммам. А именно, обозначим через  $\lambda_1^t, \dots, \lambda_m^t$  длины столбцов диаграммы  $\lambda$  и положим  $\Lambda^\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \Lambda^{\lambda_1^t} V \otimes \dots \otimes \Lambda^{\lambda_m^t} V$ . Пространство  $S^\lambda V$  является фактором пространства  $\Lambda^\lambda V$  по соотношениям *столбцового обмена*. Чтобы их написать, введём следующие обозначения. Будем называть *векторным заполнением* диаграммы  $\lambda$  таблицу, которая получается расстановкой произвольных векторов  $v_1, \dots, v_n \in V$ , где  $n = |\lambda|$ , в клетки диаграммы  $\lambda$ . Для данного векторного заполнения  $T$  диаграммы  $\lambda$  через  $v^T \in \Lambda^\lambda$  обозначается тензорное произведение лежащих  $\Lambda^{\lambda_1^t} V, \dots, \Lambda^{\lambda_m^t} V$  грасмановых мономов, полученных грасмановым перемножением векторов в каждом столбце диаграммы в порядке от верхнего к нижнему. Каждое соотношение столбцового обмена отвечает выбору какого-нибудь векторного заполнения  $T$ , каких-нибудь двух соседних столбцов диаграммы  $\lambda$  — пусть это будут  $i$ -й и  $(i+1)$ -й столбцы — и какого-нибудь непустого множества  $I$  клеток в  $(i+1)$ -м столбце. Оно имеет вид  $v^T = \sum_{\sigma} v^{\sigma T}$ , где  $\sigma$  пробегает все перестановки векторов  $v_i$ , осуществляющие сохраняющий порядок<sup>2</sup> обмен векторов из клеток  $I$  с какими-либо  $|I|$  векторами из предыдущего  $i$ -го столбца, а  $\sigma T$  означает результат применения перестановки  $\sigma$  к заполнению  $T$ . Например,

<sup>1</sup>Т. е. неприводимое представление группы  $S_n$ , отвечающее диаграмме  $\lambda$ .

<sup>2</sup>Сохранение порядка означает, что если векторы  $u, w \in I$  меняются соответственно с векторами  $u', w'$  из  $i$ -го столбца, и в  $(i+1)$ -м столбце  $u$  стоит выше, чем  $w$ , то в  $i$ -м столбце  $u'$  стоит выше, чем  $w'$ .

для заполнения

|       |       |
|-------|-------|
| $v_1$ | $v_3$ |
| $v_2$ |       |

трёхклеточной диаграммы  $\lambda = (2, 1)$  имеется ровно одно соотношение обмена, требующее, чтобы для любых векторов  $v_1, v_2, v_3 \in V$  в пространстве  $S^{(2,1)}V$  выполнялось соотношение

$$(v_1 \wedge v_2) \otimes v_3 = (v_3 \wedge v_2) \otimes v_1 + (v_1 \wedge v_3) \otimes v_2. \quad (5-20)$$

Подробности см. в книге: У. Фултон. Таблицы Юнга и их применение в..., М., «МЦНМО».

ПРИМЕР 5.2 (РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕНЗОРНОГО КУБА<sup>1</sup>)

Разложение тензорного куба  $V^{\otimes 3}$  в сумму неприводимых  $GL(V) \times S_3$ -модулей имеет вид

$$V^{\otimes 3} \simeq S^3V \boxtimes \mathbb{1} \oplus \text{Lie}^3V \boxtimes \Delta_2 \oplus \Lambda^3V \boxtimes \text{sgn},$$

где  $\mathbb{1}$ ,  $\text{sgn}$  и  $\Delta_2$  суть одномерное тривиальное, одномерное знаковое и двумерное симплициальное представления симметрической группы  $S_3$ , а  $S^3V$ ,  $\Lambda^3V$  и  $\text{Lie}^3V$  суть неприводимые представления группы  $GL(V)$  в пространствах однородных симметрических, грассмановых и лиевских многочленов степени 3. Пространства  $S^3V$  и  $\Lambda^3V$  изоморфны подпространствам симметричных и знакопеременных тензоров  $\text{Sym}^3V \subset V^{\otimes 3}$  и  $\text{Alt}^3V \subset V^{\otimes 3}$ , а пространство  $\text{Lie}^3V$  — подпространству лиевских тензоров в  $V^{\otimes 3}$ , линейно порождённому двойными коммутаторами  $[[u, v], w]$  всевозможных векторов  $u, v, w \in V$  в тензорной алгебре<sup>2</sup>  $TV$ . Пространство лиевских тензоров степени два  $\text{Lie}^2V \simeq \Lambda^2V$  изоморфно подпространству знакопеременных тензоров  $\text{Alt}^2V \subset V^{\otimes 2}$ , которое линейно порождается коммутаторами  $[u, w] = u \otimes w - w \otimes u$  всевозможных векторов  $u, w \in V$ . Коммутатрное умножение

$$\text{Lie}^2V \otimes V \rightarrow \text{Lie}^3V, \quad \tau \otimes v \mapsto [\tau, v],$$

сюрьективно, и его ядро линейно порождается всевозможными трёхчленными суммами

$$[v_1, v_2] \otimes v_3 + [v_2, v_3] \otimes v_1 + [v_3, v_1] \otimes v_2,$$

которые переходят в нуль в силу тождества Якоби для коммутаторов<sup>3</sup>. Иначе говоря,  $\text{Lie}^3V$  получается из факторизацией  $\text{Lie}^2V \otimes V \simeq \Lambda^2V \otimes V$  по соотношениям (5-20). Орбита ненулевого лиевского тензора  $\omega \in V^{\otimes 3}$  под действием симметрической группы  $S_3$  порождает двумерное векторное подпространство, на котором  $S_3$  действует группой треугольника с вершинами  $\omega$ ,  $\tau\omega$ ,  $\tau^2\omega$ , где  $\tau \in S_3$  — цикл длины три. Вся компонента  $\text{Lie}^3V \boxtimes \Delta_2$  является образом  $\Delta_2$ -изотипного проектора  $e - (e + \tau + \tau^2)/3 \in \mathbb{k}S_3$  или, что тоже самое, ядром оператора  $(e + \tau + \tau^2)/3$  усреднения по 3-циклу. Каждый неприводимый  $GL(V)$ -подмодуль этой компоненты имеет вид  $\text{Lie}^3V \boxtimes u$ , где  $u \in \Delta_2$ , и группа  $S_3$  переставляет эти подмодули, действуя на вектор  $u$  симметриями треугольника.

<sup>1</sup>Ср. с примером 14.6 на с. 233 лекций [Алг1].

<sup>2</sup>Напомним, что  $[a, b] = a \otimes b - b \otimes a$  для  $a, b \in TV = \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k}$ .

<sup>3</sup>См. упражнение 14.15 на с. 234 лекций [Алг1].

### Ответы и указания к некоторым упражнениям

Упр. 5.3. Примените [сл. 5.1](#) на стр. 49 к перестановке  $g^{-1}$ .

Упр. 5.5. Аналогом равенства (5-6) и [лем. 5.2](#) является равенство  $\text{sgn}(q)qs'_Tp = s'_T$ , справедливое для всех  $p \in R_T$ ,  $q \in C_T$ , и утверждение о том, что пространство

$$E'_T = \{f \in \mathbb{C}S_n \mid \forall p \in R_T \forall q \in C_T \text{sgn}(q)qfp = f\}$$

одномерно и порождается симметризатором  $s'_T$ . Последнее доказывается при помощи [упр. 5.3](#) дословно также, как [лем. 5.2](#). Дополнением к [лем. 5.4](#) на стр. 51 является равенство  $s'_T \mathbb{C}S_n s'_U = 0$ , справедливое при  $\lambda(T) > \lambda(U)$  и непосредственно вытекающее из оригинальной [лем. 5.4](#). Утверждения из [лем. 5.3](#) и [теор. 5.1](#) на стр. 51, как и их доказательства, сохраняют силу после замены  $s$  на  $s'$ .