

Порция коммутативной алгебры

АГ4♦1. Для идеалов I, J кольца A обозначим через IJ идеал, порождённый произведениями ab с $a \in I, b \in J$. Верно ли что а) произведения ab и так, сами по себе, образуют идеал б) $IJ = I \cap J$ в) $IJ = I \cap J$, когда $I + J = A$ г) $V(I) \cup V(J) = V(IJ) = V(I \cap J)$ д) $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J}$ е) $\sqrt{IJ} = \sqrt{I} \sqrt{J}$ ж) $IJ = \sqrt{IJ}$, когда $I = \sqrt{I}$ и $J = \sqrt{J}$

АГ4♦2. Пусть $J = (xy, yz, zx) \subset \mathbb{k}[x, y, z]$. Опишите $V(J) \subset \mathbb{A}^3$ и $I(V(J)) \subset \mathbb{k}[x, y, z]$. Можно ли задать многообразие $V(J)$ двумя полиномиальными уравнениями?

АГ4♦3. Укажите многочлен $f \in I(V(J)) \setminus J$ для $J = (x^2 + y^2 - 1, y - 1) \subset \mathbb{k}[x, y]$.

АГ4♦4. Опишите $V(J) \subset \mathbb{A}^3$ и $I(V(J))$ для а) $J = (xy, (x - y)z)$ б) $J = (xy + yz + zx, x^2 + y^2 + z^2)$.

АГ4♦5. Нётерово ли кольцо а) степенных рядов над нётеровым кольцом б) рядов $f \in \mathbb{C}[[z]]$, сходящихся всюду в $\mathbb{C}$ в) рядов $f \in \mathbb{C}[[z]]$ с ненулевым радиусом сходимости г) кольцо рациональных функций $p(z)/q(z) \in \mathbb{C}(z)$ с $q(z) \neq 0$ при $|z| \leq 1$ д*) произвольная подалгебра $A \subset \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$, имеющая конечную коразмерность как векторное пространство над $\mathbb{k}$.

АГ4♦6. Пусть элементы $m_1, \dots, m_r \in M$ порождают A -модуль M и A -линейный эндоморфизм $\varphi : M \rightarrow M$ действует на них по правилу $(m_1, \dots, m_r) \mapsto (m_1, \dots, m_r) \cdot F$, где F — квадратная $r \times r$ матрица с элементами из A . Докажите, что а) $\det(F) \cdot M \subset \varphi(M)$ б) если M A -точен¹, то $I \cdot M \neq M$ для любого собственного идеала $I \subsetneq A$.

АГ4♦7. Покажите, что факториальное кольцо целозамкнуто в своём поле частных.

АГ4♦8. Цело ли кольцо непрерывных функций на $\mathbb{R}^2$ над подкольцом $\{f \mid f(1, 0) = f(0, 1)\}$?

АГ4♦9. Существует ли бесконечное поле, конечно порождённое как $\mathbb{Z}$ -алгебра²?

АГ4♦10*. Покажите, что кольцо многочленов над нормальным кольцом тоже нормально.

АГ4♦11. Покажите, что кривая $V(x^2 - y^3) \subset \mathbb{A}^2$ неприводима, но не нормальна.

АГ4♦12. Нормален ли конус $V(x^2 - y^2 - z^2) \subset \mathbb{A}^3$?

АГ4♦13. Пусть над алгебраически замкнутым полем многочлен f обращается в нуль в каждой точке гиперповерхности $V(g) \subset \mathbb{A}^n$. Покажите, что каждый неприводимый сомножитель многочлена g делит многочлен f . Так ли тут существенна замкнутость поля?

АГ4♦14. Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство, A — кольцо непрерывных функций $X \rightarrow \mathbb{R}$. Покажите, что отображение $X \rightarrow \text{Spec}_m A, x \mapsto \ker \text{ev}_x$, биективно и топология Зарисского на $\text{Spec}_m A$ совпадает с исходной топологией на X .

АГ4♦15*. Всякий ли простой идеал кольца непрерывных функций $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ максимален?

АГ4♦16. Опишите замыкание единичной сферы $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ в топологии Зарисского на комплексной аффинной плоскости $\mathbb{A}^2(\mathbb{C})$.

АГ4♦17. Приведите пример непрерывного в топологии Зарисского, но не регулярного морфизма аффинных алгебраических многообразий.

АГ4♦18. Пусть $X = \text{Spec}_m A$ — аффинное алгебраическое многообразие. Покажите, что разложимость A в прямое произведение³ $A = A_1 \times A_2$ равносильна разложимости X в дизъюнктное объединение $X = X_1 \sqcup X_2$ двух собственных замкнутых подмножеств.

АГ4♦19. Для аффинных алгебраических многообразий $X \subset \mathbb{A}^n, Y \subset \mathbb{A}^m$, уравнения которых известны, опишите систему уравнений, реализующих $X \times Y$ как подмногообразие в $\mathbb{A}^{n+m}$ и покажите, что $X \times Y$ неприводимо, если X и Y неприводимы.

¹Т. е. $\forall a \in A \ aM = 0 \Rightarrow a = 0$.

²С тавтологическим действием $n \cdot a \stackrel{\text{def}}{=} a + a + \dots + a$ (n одинаковых слагаемых).

³Напомним, что для разложимости алгебры (даже не обязательно коммутативной) в прямое произведение двух подалгебр необходимо и достаточно разложения единицы $1 = e_1 + e_2$ в сумму двух независимых идемпотентов, т. е. таких элементов e_1, e_2 , что $e_1^2 = e_1, e_2^2 = e_2, e_1 e_2 = e_2 e_1 = 0$ (докажите это!).

№	дата	кто принял	подпись
1а			
б			
в			
г			
д			
е			
ж			
2			
3			
4а			
б			
5а			
б			
в			
г			
д			
6а			
б			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			