

Соображения размерности

АГ6♦1. Покажите, что изолированные точки слоёв любого регулярного морфизма $\varphi : X \rightarrow Y$ заматают открытое (возможно, пустое) подмножество в X .

АГ6♦2 (теорема Шевалле о конструктивности). Докажите, что образ регулярного морфизма алгебраических многообразий получается применением конечного числа операций пересечения, объединения и разности к конечному числу открытых и замкнутых подмножеств.

АГ6♦3 (геометрическое определение размерности). Покажите, что размерность неприводимого многообразия $X \subset \mathbb{P}_n$ равна: а) наибольшему такому $d \in \mathbb{Z}$, что $X \cap L \neq \emptyset$ для любого $(n - d)$ -мерного проективного подпространства $L \subset \mathbb{P}_n$ б) наименьшему $d \in \mathbb{Z}$, для которого имеется $(n - d - 1)$ -мерное проективное подпространство $L \subset \mathbb{P}_n$ с $X \cap L = \emptyset$ в) наименьшему такому $d \in \mathbb{Z}$, что $X \cap L = \emptyset$ для общего¹ $(n - d - 1)$ -мерного проективного подпространства $L \subset \mathbb{P}_n$.

АГ6♦4. Покажите, что множество $(n - d)$ -мерных проективных подпространств $H \subset \mathbb{P}(V)$, пересекающих произвольно заданное d -мерное проективное многообразие $X \subset \mathbb{P}_n = \mathbb{P}(V)$ по конечному множеству точек, является плотным открытым по Зарисскому подмножеством грассманиана² $\text{Gr}(n + 1 - d, V)$, параметризующего все $(n - d)$ -мерные проективные подпространства в $\mathbb{P}(V)$.

АГ6♦5 (k -детерминанталь). Обозначим через $\mathcal{D}_k(m, n) \subset \mathbb{P}(\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{k}))$ проективное многообразие матриц M из m строк и n столбцов с $\text{rk } M \leq k$. С помощью подходящего многообразия инцидентности $\Gamma = \{(L, M) \mid L \subset \ker M\}$ (где L — подпространство, а M — матрица) покажите, что $\mathcal{D}_k(m, n)$ неприводимое проективное многообразие и найдите $\dim \mathcal{D}_k(m, n)$.

АГ6♦6. Покажите, что множество всех поверхностей 4-й степени $S \subset \mathbb{P}_3 = \mathbb{P}(V)$, на которых имеется хоть одна прямая, образует неприводимую алгебраическую гиперповерхность в пространстве $\mathbb{P}(S^4 V^*)$ всех поверхностей 4-й степени.

АГ6♦7 (изотропные грассманианы). Покажите, что множество n -мерных проективных подпространств, лежащих на гладкой $(2n + 1)$ -мерной квадрике в $\mathbb{P}_{2n+2}$ (соотв. на гладкой $2n$ -мерной квадрике в $\mathbb{P}_{2n+1}$) является неприводимым проективным многообразием (соотв. дизъюнктивным объединением двух изоморфных друг другу проективных многообразий) и выясните размерности этих многообразий³.

АГ6♦8 (многообразие секущих). Для неприводимого $X \subset \mathbb{P}(V)$ обозначим через $\mathcal{S}(X) \subset \text{Gr}(2, V)$ замыкание множества всех прямых (p, q) с $p, q \in X$ и $p \neq q$, а через $S(X) \subset \mathbb{P}(V)$ — объединение в $\mathbb{P}(V)$ всех прямых ℓ из $\mathcal{S}(X)$. Покажите, что а) $\mathcal{S}(X)$ неприводимо и $\dim \mathcal{S}(X) = 2 \dim X$ б) $S(X)$ неприводимо и $\dim S(X) \leq 2 \dim X + 1$ в) если X — скрученная⁴ кривая, то $\dim S(X) = 3$.

АГ6♦9* (нормализация). Размерностью $\dim K$ нётерова коммутативного кольца K называется максимальное такое $d \in \mathbb{Z}$, что имеется цепочка простых идеалов $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d \subsetneq K$. Пусть $\mathbb{k}$ — любое поле, K — конечно порождённая приведённая $\mathbb{k}$ -алгебра, идеалы $I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_m \subset K$ таковы, что факторы $K_j = K/I_j$ имеют размерности $d_1 > d_2 > \dots > d_m$, а $\dim K = d$. Покажите, что существует такое подкольцо многочленов $S = \mathbb{k}[x_1, \dots, x_d] \subset K$, что K конечно порождено как S -модуль и $I_j \cap S = (x_{d_j+1}, \dots, x_d)$ для всех $1 \leq j \leq m$.

¹Т. е. лежащего в некотором открытом по Зарисскому плотном подмножестве грассманиана $\text{Gr}(n - d, V)$, параметризующего все $(n - d - 1)$ -мерные проективные подпространства в $\mathbb{P}(V)$.

ПОДСКАЗКА: рассмотрите многообразие инцидентности $\Gamma = \{(L, M) \mid L \subset \ker M\} \subset \text{Gr}(n - d, V) \times \text{Gr}(d, V)$ и используйте проекцию $\pi_1 : \Gamma \rightarrow \text{Gr}(n - d, V)$ и проекцию $\pi_2 : \Gamma \rightarrow \text{Gr}(d, V)$ для установления неприводимости и подсчёта размерности.

³Они называются *изотропными грассманианами*.

⁴Т. е. не содержащаяся в плоскости.

Персональный табель _____.
(напишите свои имя, отчество и фамилию)

Листок № 6 (17.11.2025)

№	дата	кто принял	подпись
1			
2			
3а			
б			
в			
4			
5			
6			
7			
8а			
б			
в			
9			