

чумы – лумы – вумы

Задача 1. Убедитесь, что инъективность отображения $f : X \rightarrow Y$ эквивалентна каждому из свойств:

а) $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$ б) существует такое $\pi : Y \rightarrow X$, что $\pi \circ f = \text{Id}_X$.

Задача 2. Убедитесь, что а) отображение $f : X \rightarrow Y$ сюръективно, если и только если $g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$ б) существование такого отображения $\sigma : Y \rightarrow X$, что $f \circ \sigma = \text{Id}_Y$, влечёт сюръективность f .

Аксиома выбора утверждает, что верно и обратное к зад. 2 б): у каждого сюръективного отображения $f : X \rightarrow Y$ есть *сечение*¹ – такое отображение $\sigma : Y \rightarrow X$, что $f \circ \sigma = \text{Id}_Y$.

Чумовая терминология (продолжение). Два чума *изоморфны*, если между ними есть сохраняющая порядок биекция. В чуме P подмножество вида $\langle p \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in P \mid x < p\}$, где $p \in P$, называется *начальным интервалом* до p . Элемент p чума P называется *внешней верхней гранью* подмножества $X \subset P$, если $x < p$ для всех $x \in X$. В частности, любой $x \in P$ является внешней верхней гранью для $\emptyset \subset P$ и для $\langle x \rangle \subset P$.

Задача 3 (линейный порядок на вумах). Докажите, что любые два вума или изоморфны, или один из них изоморфен начальному отрезку другого, и эти возможности взаимно исключающие.

Задача 4 (ключевое соображение). Для произвольного чума P обозначим через $\mathcal{W}(P)$ множество всех его подмножеств, вполне упорядоченных имеющимся в P частичным порядком. Также включим в $\mathcal{W}(P)$ пустое подмножество $\emptyset \subset P$. Пусть отображение $\beta : \mathcal{W}(P) \rightarrow P$ переводит каждый вум в его внешнюю верхнюю грань. Докажем, что *такого не бывает*. Назовём вум $W \subset P$ β -стабильным, если $\forall x \in W \beta(\langle x \rangle) = x$. Каждый начальный кусок вума

$$\left\{ \beta(\emptyset), \beta(\{\beta(\emptyset)\}), \beta(\{\beta(\emptyset), \beta(\{\beta(\emptyset)\})\}), \dots \right\}$$

β -стабилен, а сам он «продолжается вправо, пока не исчерпает всё P ». Последнее формализуется так: докажите, что а) если β -стабильные вумы U, W имеют общий минимальный элемент, то $U \subset W$ или $W \subset U$ б) объединение \mathcal{U} всех β -стабильных вумов с минимальным элементом $\beta(\emptyset)$ является β -стабильным вумом. в) Рассмотрите вум $\mathcal{U} \cup \beta(\mathcal{U})$ и получите противоречие.

Задача 5 (лемма Цорна). Докажите, что если каждый вум в чуме P имеет верхнюю² грань, то в P есть максимальный элемент³. Более слабое утверждение: *в каждом полном чуме P есть максимальный элемент*⁴, известно как *лемма Цорна*.

Задача 6 (лемма Бурбаки – Витта о неподвижной точке). Пусть отображение $f : P \rightarrow P$ полного чума P в себя таково, что $f(x) \geq x$ для всех $x \in X$. Покажите, что $f(p) = p$ для некоторого $p \in P$.

Задача 7. Выполните из леммы Цорна а) *теорему Хаусдорфа о цепях*: в любом чуме каждый лум содержится в некотором максимальном по включению луме⁵ б) аксиому выбора⁶ в) *лемму о замене*: пусть в векторном пространстве V множество векторов $I \subset V$ линейно независимо, а множество $G \subset V$ линейно порождает V ; тогда существует такое инъективное отображение $\iota : I \hookrightarrow G$, что множество векторов $I \cup (G \setminus \text{im } \iota)$ тоже линейно порождает V .

Задача 8 (теорема Цермело). Докажите, что каждое множество X можно вполне упорядочить⁷.

¹Иначе говоря, во всех непустых слоях любого отображения можно одновременно выбрать по элементу.

²Не обязательно внешнюю!

³Подсказка: предположите противное и при помощи аксиомы выбора постройте отображение $\beta : \mathcal{W}(P) \rightarrow P$, которого не бывает по зад. 4.

⁴Напомним, что чум называется *полным*, если в нём каждый лум имеет верхнюю грань. Элемент $p^* \in P$ называется *максимальным*, если неравенство $p^* \leq p$ выполняется только для $p = p^*$.

⁵Подсказка: все лумы, содержащие данный, образуют полный чум по включению.

⁶Подсказка: рассмотрите максимальный элемент полного чума, образованного парами (U, g) , где $U \subset Y$ и $g : U \rightarrow X$ – такое отображение, что $fg = \text{Id}_U$, а $(U, g) \leq (W, h)$, означает, что $U \subset W$ и $g = h|_U$.

⁷Подсказка: рассмотрите множество $\mathcal{S}(X)$ всех непустых подмножеств в X , включая само X , и при помощи аксиомы выбора постройте такое отображение $\mu : \mathcal{S}(X) \rightarrow X$, что $\mu(Y) \in Y$ для всех $Y \in \mathcal{S}(X)$; назовём подмножество $W \subset X$ μ -стабильным, если его можно вполне упорядочить так, что $\mu(X \setminus \langle w \rangle) = w$ для всех $w \in W$; используя «зеркальную версию» ключевого соображения из зад. 4, убедитесь, что вум $\{\mu(X), \mu(X \setminus \{\mu(X)\}), \mu(\{\mu(X), \mu(X \setminus \{\mu(X)\})\}), \dots\}$ μ -стабилен и продолжается вправо пока не исчерпает весь X .